



Republica Moldova

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN Nr. OMS1033/2021
din 11.11.2021

cu privire la aprobarea Listei Naționale a Medicamentelor Esențiale

Publicat : 19.11.2021 în MONITORUL OFICIAL Nr. 280-284 art. 1320 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52-53, art. 368), precum și în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2021,

ORDON:

1. Se aprobă Lista Națională a Medicamentelor Esențiale (se anexează).
2. Se abrogă Anexa nr. 2, la ordinul ministrului sănătății nr. 162/2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și Listei medicamentelor esențiale”.
3. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice de toate nivelurile, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Centrul pentru Achiziții Centralizate în Sănătate, Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, precum și instituțiile de învățământ cu profil medical, vor asigura promovarea Listei Naționale a Medicamentelor Esențiale, aprobate prin prezentul ordin, în scopul utilizării raționale a medicamentului.
4. Prezentul ordin se publică pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății.
5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin mi-l asum.

MINISTRU Ala NEMERENCO

Nr. 1033. Chișinău, 11 noiembrie 2021.

[anexa](#)

Lista Națională de Medicamente Esențiale

Anexa la Ordinul MS nr. 1033 din 11 noiembrie 2021

□ - indică performanța clinică similară într-o clasă farmacologică. Medicamentul enumerat trebuie să fie exemplul clasei pentru care există cele mai bune dovezi pentru eficacitate și siguranță.

[c] medicamentul necesită facilități de diagnostic sau monitorizare specializată

Denumirea comună internățională	Doza	Forma farmaceutică		Codul ATC	Notă
1. Anestezice, preoperative și gaze medicale					
1.1 Anestezice generale și oxigen					
1.1.1 Medicamente inhalatorii					
Halothanum	250 ml	lichid/vapori de inhalat		N01AH01	
		soluție de inhalat prin nebulizator		N01AB01	
Isofluranum	200 ml	lichid/vapori de inhalat		N01AB06	
	100 ml	lichid/vapori de inhalat		N01AB06	
	250 ml	lichid/vapori de inhalat		N01AB06	
Protoxid de azot		gaz de inhalat		N01AX13	
Oxigen (medicinal)	0	gaz de inhalat		V03AN01	
1.1.2 Medicamente injectabile					
Ketaminum	50 mg/ml	sol.inj.		N01AX03	
Propofolum	10 mg/ml	sol. inj./sol. perf.		N01AX10	□ Alternativă terapeutică Thiopentalum
Thiopentalum natrium	0,5g	pulb. liof./sol. perf.		N01AF03	
	1g	pulb. liof./sol. perf.		N01AF03	
1.2 Anestezice locale					
Bupivacainum	0,25%	sol. inj.		N01BB01	
	0,50%	sol. inj.		N01BB01	□ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
Lidocaini hydrochloridum	5%	sol. inj.		N01BB02	□ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	2%	sol. inj.		N01BB02	□ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	4%	soluție uz extern		N01BB02	□ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
					□ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	1%	sol. inj.		N01BB02	□ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate

Lidocainum+ Epinephrinum	2% +epinefrină 1:80 000	sol. inj.		N01BB51	
	1%+1:200 000	sol. inj.		N01BB52	
	2%+1:200 000	sol. inj.		N01BB52	
Articainum	40 mg/ml 2 ml	sol. inj.		N01BB	
Articainum + Epinephrinum	68 mg + 0,017 mg	sol. inj.		N01BB58	
	68 mg + 0,0085 mg	sol. inj.		N01BB58	
	40 mg+12 mcg/ml 1.7 ml	sol. inj.		N01BB58	
	40 mg + 10 mcg/ml	sol. inj.		N01BB58	
1.2 Lista complementară					
Ephedrinum	30 mg/ml	sol. inj.		R03CA02	
1.3 Medicație preoperatorie și sedare pe termen scurt					
Atropini sulfas	1 mg/ml	sol. inj.		A03BA01	
Midazolamum	5 mg/5 ml	sol.inj.		N05CD08	☐ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	1 mg/1 ml	sol.inj.		N05CD08	☐ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	2 mg/ ml	soluție orală		N05CD08	☐ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	7,5 mg	comprimate		N05CD08	☐ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	15 mg	comprimate		N05CD08	☐ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
Morphinum	10 mg/ml	sol. inj.		N02AA01	oxicodonă
1.4 Gaze medicinale					
Oxygen (medicinal)		gaz de inhalat		V03AN01	Pentru utilizare în tratamentul hipoxemiei. * Nu se va utiliza mai mult de 30% oxigen pentru inițierea resuscitării nou-născuților mai mici sau egali cu 32 de săptămâni de gestație.
2. Medicația antidoloră și tratamentul paliativ					
2.1 Medicamente antiinflamatoare non-opioide și non-steroidiene					
Acidum acetylsalicylicum	50 mg	supozitoare		N02BA01	
	150 mg	supozitoare		N02BA01	
	100 mg	comprimate		N02BA01	
	150 mg	comprimate		N02BA01	
	300 mg	comprimate		N02BA01	
	500 mg	comprimate		N02BA01	
Ibuprofenum	200 mg	Forme orale solide		M01AE01	* Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni.
	400 mg	Forme orale solide		M01AE01	* Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni.
	100 mg/5 ml	sirop, suspensie orală		M01AE01	* Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni.
	200 mg/5 ml	suspensie orală		M01AE01	* Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni.
	60 mg	supozitoare		M01AE01	* Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni.
	125 mg	supozitoare		M01AE01	* Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni.
Paracetamolum	5mg/ml	sol. inj./sol. perf.		M01AE01	* Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni.
	125 mg/5ml	suspensie orală		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	100 mg	supozitoare		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	100 mg	comprimate		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	200 mg	comprimate		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	300 mg	comprimate		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	500 mg	comprimate		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	120 mg/5 ml	sirop, suspensie orală		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	50 mg	supozitoare		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	125 mg	supozitoare		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	250 mg	supozitoare		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
	10 mg/ml	sol. perf.		N02BE01	*Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens.
Lista complementară					
Diclofenacum	25 mg	supozitoare		M01AB05	
	75 mg/3 ml	sol. inj.		M01AB05	
	50 mg	supozitoare		M01AB05	
	100 mg	supozitoare		M01AB05	

Metamizoli natrium	50% 2 ml	sol. inj.		N02BB02	
Ketoprofenum	50 mg	capsule		M01AE03	
	150 mg	capsule		M01AE03	
	100 mg	supozitoare		M01AE03	
	100 mg	comprimate		M01AE03	
	150 mg	comprimate cu elib.		M01AE03	
	30 mg/ml	sol.inj.		M01AB15	
	10 mg	comprimate		M01AB15	
Meloxicamum	15 mg/1,5 ml	sol. inj		M01AB15	
	7.5 mg	comprimate		M01AC06	
	15 mg	comprimate		M01AC06	
Nimesulidum	100 mg	comprimate		M01AX17	paliative, doar pentru durerile acute de scurtă durată, durata de tratament de până la 15 zile!
	100 mg	granule/susp. orala sau nuli /sol. orală		M01AX17	paliative, doar pentru durerile acute de scurtă durată, durata de tratament de până la 15 zile!
2.2 Analgezice opioide					
Codeini phosphas	30 mg	comprimate		R05DA04	
Fentanylum	50 µg/ml	sol.inj.		N01AH01	*Pentru tratamentul durerii în cancer
	25 mcg/h	sistem terapeutic transdermic		N01AH01	*Pentru tratamentul durerii în cancer
	50 mcg/h	sistem terapeutic transdermic		N01AH01	*Pentru tratamentul durerii în cancer
	75 mcg/h	sistem terapeutic transdermic		N01AH01	*Pentru tratamentul durerii în cancer
	100 mcg/h	sistem terapeutic transdermic		N01AH01	*Pentru tratamentul durerii în cancer
Morphinum	10 mg/ml	sol. inj.		N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
	10 mg/5ml	soluție orală		N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
	10 mg	comprimate		N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
	10 mg	comprimate cu eliberare prelungită		N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
	30 mg	comprimate cu eliberare prelungită		N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
	60 mg	comprimate cu eliberare		N02AA01	Oxycodonum
	20 mg	comprimate		N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
	20 mg/ml	soluție orala		N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
	2 mg/ml 100 ml	sirop		N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
2.3 Lista complementară					
Methadonum	5 mg/ml	Soluție orală		N07BC02	*Pentru managementul durerii în cancer
	5 mg	Comprimate		N07BC02	*Pentru managementul durerii în cancer
	10 mg	Comprimate		N07BC02	*Pentru managementul durerii în cancer
	5 mg/5 ml	Soluție orală		N07BC02	*Pentru managementul durerii în cancer
	10 mg/ 5 ml	Soluție orală		N07BC02	*Pentru managementul durerii în cancer
Tramadolum	50 mg	capsule		N02AX02	
	100 mg	comprimate elib. prel.		N02AX02	
	150 mg	comprimate elib. prel.		N02AX02	
	50 mg/ml	sol. inj.		N02AX02	
	100 mg	supozitoare		N02AX02	
2.3 Medicamente pentru alte simptome frecvente în îngrijirea paliativă					
Amitriptylinum	25 mg	comprimate, drajeuri		N06AA09	
	20 mg/2 ml	sol. inj.		N06AA09	
	10 mg	comprimate		N06AA09	
	75 mg	comprimate		N06AA09	
Cyclizinium	50 mg	comprimate		R06AE03	[c]
	50 mg/ml	sol. inj.		R06AE03	[c]
Dexamethasonum	4 mg/ml	sol. inj.		H02AB02	
	0,5 mg	comprimate		H02AB02	
	4 mg	comprimate		H02AB02	
	2 mg	comprimate		H02AB02	
	2mg/5 ml	soluție orală		H02AB02	

Diazepamum	5 mg	comprimate		N05BA01	
	5 mg	soluție rectală		N05BA01	
	10 mg/2 ml	sol. inj.		N05BA01	
	10 mg	soluție rectală		N05BA01	
	2,5 mg	soluție rectală		N05BA02	
	10 mg	comprimate		N05BA03	
Docusati sodium	50 mg/5 ml	soluție orală		A06AA02	
	100 mg	capsule		A06AA02	
Fluoxetinum	20 mg	capsule		N06AB03	> 8 ani
	20 mg	comprimate		N06AB03	> 8 ani
Haloperidolum	5mg/ml	sol. inj.		N05AD01	
	2mg	comprimate		N05AD01	
	5mg	comprimate		N05AD01	
	2mg/ml	soluție orală		N05AD01	
	0,5 mg	comprimate		N05AD01	
Hydrogenii peroxydum	3%	soluție		D08AX01	
Hyoscini butylbromidum	20 mg/ml 1 ml	sol. inj.		A03BA03	
	10 mg	drajeuri		A03BA03	
Hyoscini hydrobromidum	400 microgram/ml	sol. inj.		A04AD01	[c]
	600 microgram/ml	sol. inj.		A04AD02	[c]
Lactulosum	3,1-3,7 g/5 ml	soluție orală/sirop		A06AD12	[c]
Loperamidum	2 mg	Capsule/ Comprimate		A07DA03	
	1 mg/5 ml	soluție orală		A07DA03	
Metoclopramidum	10 mg	comprimate		A03FA01	
	5 mg / 2 ml	sol. inj.		A03FA01	
	5 mg/5 ml	soluție orală		A03FA01	
	1 mg/5 ml	sirop		A03FA01	
	5 mg/ml	sol.inj.		A03FA01	
Midazolamum	5 mg/5 ml	sol.inj.		N05CD08	
	1 mg/1 ml	sol.inj.		N05CD08	
	5 mg/ml	sol.inj.		N05CD08	
	2 mg/ ml	soluție orală		N05CD08	[c]
	7,5 mg	Comprimate		N05CD08	
	15 mg	Comprimate		N05CD08	
Ondansetronum	2 mg/ml	sol. inj.		A04AA01	□ Alternative terapeutice - Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună
	4 mg /5ml	soluție orală		A04AA01	□ Alternative terapeutice - Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună
	4 mg	comprimate		A04AA01	□ Alternative terapeutice - Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună
	8 mg	comprimate		A04AA01	□ Alternative terapeutice - Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună
Oxybutyninum hydrochloridum	5 mg	comprimate		G04BD04	
Drotaverinum	40 mg	comprimate		A03AD02	
	20 mg/ml	sol. inj.		A03AD02	
Papaverinum	2% 2 ml	sol. inj.		A03AD01	
Platyphyllini hydrotartras	0,2%	sol. inj.		A03AX	
Senna	70 mg	comprimate		A06AB06	
	7,5 mg/5 ml	soluție orală		A06AB06	
	7,5 mg	comprimate		A06AB06	
3. Antialergice și medicamente utilizate în anafilaxie					
Dexamethasonum	4 mg/ml	sol. inj.		H02AB02	
Epinephrinum	1 mg/ml	sol. inj.		R03AA01	* Adrenalinum
	0,18% 1ml	sol.inj		C01CA24	* Adrenalinum
Hydrocortisonum	1%	unguent oftalmic		S01BA02	
	2.5%	Suspensie injectabila		H02AB09	

Loratadinum	10 mg	comprimate		R06AX13	*Pot fi considerate antihistaminice sedative pentru indicații limitate la copii; □ Alternative terapeutice -Cetirizinum, Fexofenadinum
	1 mg/ml	Sirop/soluție orală		R06AX13	*Pot fi considerate antihistaminice sedative pentru indicații limitate la copii; □ Alternative terapeutice -Cetirizinum, Fexofenadinum
Chloropyraminum	25 mg	comprimate		R06AC03	
	20 mg/ml	sol. inj.		R06AC03	
Clemastinum	1 mg	comprimate		R06AA04	
	1 mg/ml	sol. inj.		R06AA04	
Prednisolonum	5 mg/ml	soluție orală		H02AB06	□ Alternative terapeutice - Prednisonum
	5 mg	comprimate		H02AB06	□ Alternative terapeutice - Prednisonum
	25 mg	comprimate		H02AB06	□ Alternative terapeutice - Prednisonum
	5mg/g	unguent		H02AB06	□ Alternative terapeutice - Prednisonum
	30 mg/ml	sol. inj.		H02AB06	□ Alternative terapeutice - Prednisonum

4 Antidoturi și alte substanțe utilizate în intoxicații

4.1 Nespecifice

Carbo activatus	Nu este specificată doza	Pulbere		A07BA01	
	250 mg	Forme orale solide		A07BA01	

4.2 Specifice

Acetylcysteinum	200 mg/ml	sol. inj.		V03AB23	[c]
	10%	soluție orală		V03AB23	[c]
	20%	soluție orală		V03AB23	[c]
	100 mg	comprimate efervescente		R05CB01	[c]
	200 mg	comprimate efervescente		R05CB01	[c]
	100 mg	pulb./soluție orală		R05CB01	[c]
	200 mg	pulb./soluție orală		R05CB01	[c]
	100 mg	soluție orală		R05CB01	[c]
	200 mg	soluție orală		R05CB01	[c]
Atropinum sulfas	1 mg/ml	sol. inj.		A03BA01	
Calcii gluconas	100 mg/ml	sol. inj.		A12AA03	
Methyleni coeruleum (albastru de metilen)	10 mg/ml	sol. inj.		V03AB17	
Naloxonum	400 µcg/ml	sol. inj.		V03AB03	
Penicillaminum	250 mg	Forme orale solide cu elib. Imediată		M01CC01	
	250 mg	pic. orale, soluție		M01CC01	
	250 mg	comprimate		M01CC01	
Albastru prusian (hexacianoferat (II) de potasiu x 2H2O)	Nu este specificată doza	pulb./soluție orală		V03AB31	
Natrii nitritum (Sodium nitritum)	30 mg/ml	sol. inj.		V03AB08	
	10-20 mg/ml	sol. inj.		V03AB08	
Natrii thiosulfas	250 mg/ml	sol. inj.		V03AB15	
	30%	sol. inj.		V03AB06	
Lista complementară					
Deferoxaminum	500 mg	pulb./sol. inj.		V03AC01	
Dimercaprol	50 mg/ml 2 ml	sol. inj. uleioasă		V03AB09	
Fomepizolum (sulfat)	5 mg/ml 20 ml	sol. inj.		V03AB34	
Fomepizolum	1 g/ml 1.5 ml	sol. inj.		V03AB34	
Sodium calcium edetat	200 mg/ml 5 ml	sol. inj.		V03AB03	
Succimerum	100 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		V09CA02	

5. Anticonvulsivante / antiepileptice

Carbamazepinum	100mg/5ml	susp. orală		N03AF01	
	100 mg	comprimate		N03AF01	
	200 mg	comprimate		N03AF01	
	100 mg	comprimate masticabile		N03AF01	
	200mg	comprimate masticabile		N03AF01	
	100 mg	capsule		N03AF01	
	150 mg	comprimate cu eliberare prelungita		N03AF01	
	200 mg	capsule		N03AF01	
	300 mg	comprimate cu eliberare prelungita		N03AF01	
	400 mg	comprimate		N03AF01	
	600 mg	comprimate cu eliberare prelungita		N03AF01	

Clonazepamum	0.5 mg	comprimate		N03AE01	
	1 mg	comprimate		N03AE01	
	2 mg	comprimate		N03AE01	
Diazepamum	5 mg/2,5 ml	solutie rectala		N05BA01	
	10 mg/2.5 ml	solutie rectala		N05BA01	
	5 mg	comprimate		N05BA01	
	2 mg	comprimate		N05BA02	
	10 mg/2 ml	sol. inj.		N05BA01	
Lamotriginum	50 mg	comprimate		N03AX09	* ca terapie adjuvantă pentru rezistența la tratament a convulsiilor parțiale sau generalizate.
	100 mg	comprimate		N03AX09	* ca terapie adjuvantă pentru rezistența la tratament a convulsiilor parțiale sau generalizate.
	25 mg	comprimate		N03AX09	* ca terapie adjuvantă pentru rezistența la tratament a convulsiilor parțiale sau generalizate.
	200 mg	comprimate		N03AX09	
	2 mg	comprimate masticabile/dispersabile		N03AX09	
	5 mg	comprimate masticabile/dispersabile		N03AX09	
	25 mg	comprimate masticabile/dispersabile		N03AX09	
	50 mg	comprimate masticabile/dispersabile		N03AX09	
	100 mg	comprimate masticabile/dispersabile		N03AX09	
	200 mg	comprimate masticabile/dispersabile		N03AX09	
Levetiracetamum	250 mg	comprimate/granule drajefiate		N03AX14	
	500 mg	comprimate/granule drajefiate		N03AX14	
	100 mg/ml	soluție orală		N03AX14	
Lorazepam	2 mg/ml	formulare parenterala		N05BA06	□ Alternative terapeutice - Diazepamum, Midazolamum
	4 mg/ml	formulare parenterala		N05BA06	□ Alternative terapeutice - Diazepamum, Midazolamum
	1 mg	comprimate		N05BA06	□ Alternative terapeutice - Diazepamum, Midazolamum
	2,5 mg	comprimate		N05BA06	□ Alternative terapeutice - Diazepamum, Midazolamum

Magnesii sulfas	500 mg	sol. inj.			* Pentru utilizare în eclampsie și preeclampsie severă și nu pentru alte tulburări convulsive.
	20 g	pulb./sol. orală		A06AD04	* Pentru utilizare în eclampsie și preeclampsie severă și nu pentru alte tulburări convulsive.
	25%	sol. inj.		B05XA05	* Pentru utilizare în eclampsie și preeclampsie severă și nu pentru alte tulburări convulsive.
Midazolamum	1 mg/1 ml	sol.inj.		N05CD08	* Pentru administrare bucală atunci când soluția pentru administrare oromucoasă nu este disponibilă
	5 mg/5 ml	sol.inj.		N05CD08	* pentru administrare bucală atunci când soluția pentru administrare oromucoasă nu este disponibilă
	5 mg/ml	Soluție pentru administrare uromucozală		N05CD08	
	10 mg/ml	Soluție pentru administrare uromucozală		N05CD08	
Phenobarbitalum	200 mg/ml	sol. inj.		N03AA02	
	15 mg/5ml	sol. orală		N03AA02	
	15 mg	comprimate		N03AA02	
	100 mg	comprimate		N03AA02	
Phenytoinum	50 mg/ml	sol. inj.		N03AB02	
	25mg /5ml	soluție orală		N03AB02	
	30 mg/5ml	soluție orală		N03AB02	
	50 mg	comprimate masticabile		N03AB02	
	25 mg	capsule		N03AB02	
	50 mg	capsule		N03AB02	
	100 mg	capsule		N03AB02	
	25 mg	comprimate		N03AB02	
	50 mg	comprimate		N03AB02	
	100 mg	comprimate		N03AB02	
	117 mg	comprimate		N03AB02	
	50 mg	comprimate masticabile		N03AB02	
Acidum valproicum	200 mg/5ml	sol. orală		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	200 mg	Forme orale solide		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	500 mg	Forme orale solide		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	100 mg	Forme orale solide		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	150 mg	Forme orale solide		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	300 mg	Forme orale solide		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	600 mg	Forme orale solide		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.

	1000 mg	Forme orale solide		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	300 mg/5 ml	sirop		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	100 mg/ml	sol. inj.		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
Natrium valproatum	57,64 mg/ml	sirop		N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
Gabapentinum	100 mg	capsule		N03AX12	
	300 mg	capsule		N03AX12	
	400 mg	capsule		N03AX12	
Lista complementară					
Ethosuximidum	250 mg	capsule		N03AD01	
	250 mg/ 5 ml	soluție orală		N03AD01	
Topiramatum	25 mg	capsule		N03AX11	
6. Medicamente antiinfecțioase					
6.1 Antihelmintice					
6.1.1 Antihelmintice intestinale					
Albendazolum	400 mg	comprimate masticabile		P02CA03	
	400 mg	comprimate		P02CA03	
	200 mg	comprimate		P02CA03	
	400 mg/10 ml	suspensie orală		P02CA03	
	200 mg/5 ml	suspensie orală		P02CA03	
Ivermectinum	3 mg	comprimate		P02CF01	
	6 mg	comprimate		P02CF01	
Levamisolum	50 mg	comprimate		P02CE01	
	150 mg	comprimate		P02CE01	
Mebendazolum	100 mg	comprimate		P02CA01	
	500 mg	comprimate		P02CA01	
Niclosamidum	500 mg	comprimate		P02DA01	
Praziquantel	150 mg	comprimate		P02BA01	
	600 mg	comprimate		P02BA01	
Pyrantelum	50 mg/ml	soluție orală		P02CC01	
	250 mg	Forme orale solide		P02CC01	
	250 mg/5 ml	susp. orală		P02CC01	
Tinidazolum	500 mg	comprimate filmate		J01XD02	
6.1.2 Antifilariale					
Albendazolum	400 mg	Forme orale solide		P02CA03	
	200 mg	Forme orale solide		P02CA03	
	400 mg/10 ml	Suspensie orală		P02CA03	
	200 mg/5 ml	Suspensie orală		P02CA03	
Diethylcarbamazinum	50 mg	comprimate		P02CB02	
	100 mg	comprimate		P02CB02	

Ivermectinum	3 mg	comprimate		P02CF01	
	6 mg	comprimate		P02CF01	
6.1.3 Antischistozomiale și alte medicamente antinematode					
Praziquantelum	150 mg	comprimate		P02BA01	
	600 mg	comprimate		P02BA01	
Triclabendazolum	250 mg	comprimate		P02BX04	
<i>Lista complementară</i>					
Oxamniquinum	250 mg	capsule		P02BA02	*Se administrează doar în cazurile când eșuează tratamentul cu Praziquantelum.
	250 mg/5 ml	soluție orală		P02BA02	*Se administrează doar în cazurile când eșuează tratamentul cu Praziquantelum.
	150 mg	capsule		P02BA02	
6.1.4 Medicamente cisticide					
<i>Lista complementară</i>					
Albendazolum	400 mg	comprimate		P02CA03	
Mebendazolum	500 mg	comprimate		P02CA01	
Praziquantelum	150 mg	comprimate		P02BA01	
Praziquantelum	600 mg	comprimate		P02BA01	
6.2 Antibacteriene					
6.2.1 Access group antibiotics					
Amikacinum	250 mg/ml în fiole de 2 ml	sol. inj.		J01GB07	PRIMA LINIE - Neutropenie febrilă cu risc ridicat
	500 mg în fiole 2 ml	Pulbere injectabilă		J01GB06	- Pielonefrită sau prostatită (severă) A DOUA LINIE - Sepsis la nou-născuți și copii [c]
Amoxicillinum	125 mg/5ml	pulb./susp. orală		J01CA04	PRIMA LINIE - Pneumonie comunitară dobândită (ușoară până la moderată) - Pneumonie comunitară dobândită (severă) [c] - Malnutriție acută severă complicată [c] - Exacerbări ale BPOC - Otită medie - Faringită - Absces dentar apical progresiv - Sepsis la nou-născuți și copii [c] - Sinusită - Malnutriție acută severă necomplicată [c] A DOUA LINIE - Meningită bacteriană acută
	250 mg/5ml	pulb./susp. orală		J01CA04	
	250 mg/5ml	granule/susp. orală		J01CA04	
	250 mg	Forme orale solide		J01CA04	
	500 mg	Forme orale solide		J01CA04	
	125 mg	Forme orale solide		J01CA04	
	250 mg	Forme orale solide		J01CA04	
	500 mg	Forme orale solide		J01CA04	
	1000 mg	Forme orale solide		J01CA04	
	1000 mg	Forme orale solide		J01CA04	
	1000 mg	pulbere/sol. inj.		J01CA04	
	500 mg	pulbere/sol. inj.		J01CA04	
	250 mg	pulbere/sol. inj.		J01CA04	
	250 mg + 62,5 /5ml	pulb./susp. orală		J01CR02	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	125 mg + 31,25 /5ml	pulb./susp. orală		J01CR02	PRIMA LINIE - Pneumonie comunitară dobândită (severă) [c] - Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate)
	400 mg+57 mg/5 ml	pulb./susp. orală		J01CR02	- Exacerbări ale BPOC
	600 mg+42,9 mg/5 ml 100 ml	pulb./susp. orală		J01CR02	- Pneumonie dobândită în spital
	200 mg+28 mg/5 ml	pulb./susp. orală		J01CR02	- Neutropenie febrilă cu risc scăzut
	500 mg+125 mg	comprimate		J01CR02	- Infecții ale tractului urinar inferior
	250 mg+125 mg	comprimate		J01CR02	- Sinusită
	875 mg+125 mg	comprimate		J01CR02	- Infecții ale pielii și ale țesuturilor moi
	1000 mg+62,5 mg	comprimate		J01CR02	A DOUA LINIE - Infecții osoase și articulare
	500 mg+100 mg	pulbere/sol.inj.		J01CR02	- Pneumonie comunitară dobândită (ușoară până la moderată)
	1000 mg+200 mg	pulbere/sol.inj.		J01CR02	- Pneumonie comunitară dobândită (severă)
Ampicillinum	500 mg	sol. inj.		J01CA01	PRIMA LINIE - Otită medie
	1 g	sol. inj.		J01CA01	- Profilaxia chirurgicală
	250 mg	Forme orale solide		J01CA01	
	500 mg	Forme orale solide		J01CA01	
Benzathine benzylpenicillin	900 mg benzilpenicilină (= 1,2 mln UI)	pulb./sol. inj.		J01CE08	PRIMA LINIE - Sifilis
	1,44 benzilpenicilină (= 2,4 mln UI)	pulb./sol. inj.		J01CE08	A DOUA LINIE -

Benzylpenicillinum G	600 mg (= 1 mln UI)	pulb./sol. inj.		J01CE01	<i>PRIMA LINIE</i> – Pneumonie comunitară dobândită (severă) [c] – Malnutriție acută severă complicată [c] – Sepsis la nou-născuți și copii [c] – Sifilis <i>A DOUA LINIE</i> – Meningită bacteriană acută [c]
	3g (= 5 mln UI*)	pulb./sol. inj.		J01CE01	
Benzathini benzylpenicillinum+ Benzylpenicillinum	600000 UA	pulb./susp. inj.		J01CE30	Infecții, cauzate de microorganisme sensibile la benzilpenicilină, în cazuri, când este necesară menținerea de durată a concentrațiilor plasmatice stabile ale medicamentului:
	1500000 UA	pulb./susp. inj.		J01CE30	infecții ale căilor respiratorii și ale organelor ORL: faringite și amigdalite streptococice; infecții ale
Cefalexinum	125 mg/5ml	pulbere pentru soluție orală		J01DB01	<i>PRIMA LINIE</i> – Infecții ale pielii și ale țesuturilor moi
	250 mg/5ml	Forme orale lichide		J01DB01	<i>A DOUA LINIE</i>
	250 mg	capsule		J01DB01	– Exacerbări ale BPOC
	500 mg	capsule		J01DB01	– Faringită
Cefazolinum	1 g	pulb./sol. inj.		J01DB04	<i>PRIMA LINIE</i> – Profilaxia chirurgicală
	500 mg	pulb./sol. inj.		J01DB04	<i>A DOUA LINIE</i> – Infecții osoase și articulare
Chloramphenicolum	250 mg	capsule, comprimate		J01BA01	<i>A DOUA LINIE</i>
	500 mg	comprimate		J01BA01	– Meningită bacteriană acută
	1000 mg	pulb./sol. inj.		J01BA01	* Pentru suspensie injectabilă- doar pentru tratamentul prezumtiv al meningitei epidemice la copii mai mari de 2 ani și la adulți
	500 mg/ml	susp. inj.		J01BA01	
	150 mg/5ml (palmitat)	pic. orale, soluție		J01BA01	
	0,25%	picături oftalmice		J01BA01	
	10% 25 g	liniment		J01BA01	
	150 mg/ 5 ml	soluție orală		J01BA01	
Clindamycinum	500 mg/ml	suspensie uleioasă injectabilă		J01BA01	
	150 mg	capsule		J01FF01	<i>PRIMA LINIE</i> – Fasciită necrozantă
	150 mg/ml	sol. inj.		J01FF01	<i>A DOUA LINIE</i>
	75 mg/5ml	sol. orală		J01FF01	– Infecții osoase și articulare
	250 mg	pulb./sol. inj.		J01FF01	
	500 mg	pulb./sol. inj.		J01FF01	
Cloxacillinum	1 g	pulb./sol. inj.		J01FF01	
	500 mg	capsule		J01CF02	□ Alternative terapeutice - Subgrupul chimic al codului ATC de nivel 4 (peniciline rezistente la beta-lactamaze J01CF);
	1g	capsule		J01CF02	* Cloxacilinum, Dicloxacilinum și Flucloxacilinum sunt preferate pentru administrare orală datorită biodisponibilității mai bune.
	500 mg	pulbere pentru sol. inj.		J01CF02	<i>PRIMA LINIE</i> – Infecții osoase și articulare – Infecții ale pielii și ale țesuturilor moi <i>A DOUA LINIE</i>
Doxycyclinum	125 mg/5ml	pulbere pentru soluție orală		J01CF02	
	25 mg/5 ml	sol. orală		J01AA02	<i>PRIMA LINIE</i>
	50 mg/5 ml	sol. orală		J01AA02	– Infecție cu transmitere sexuală datorate Chlamydia trachomatis
	50 mg	Forme orale solide		J01AA02	<i>A DOUA ALEGERE</i> – Pneumonie comunitară dobândită (ușoară până la moderată)
	100 mg	Forme orale solide		J01AA02	– Exacerbări ale BPOC
Gentamicinum	100 mg	pulbere pentru sol. inj.		J01AA02	*Utilizarea la copii <8 ani doar în cazul infecțiilor se pune
	40 mg/ml	sol. inj.		J01GB03	<i>PRIMA LINIE</i> – Meningită bacteriană acută la nou-născuți [c] – Pneumonie comunitară dobândită (severă) [c] – Infecții intraabdominale complicate [c] – Malnutriție acută severă complicată [c] – Sepsis la nou-născuți și copii [c] <i>A DOUA LINIE</i> – Gonoree – Profilaxia chirurgicală
Metronidazolum	500 mg/100 ml	sol. perf.		J01XD01	<i>PRIMA LINIE</i> – infecție cu C. difficile
	200 mg/5 ml	sol. orală		J01XD01	– Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate)
	500 mg	Forme farmaceutice vaginale		J01XD01	– Infecții intradominale complicate (severe)
	1g	supozitoare		J01XD01	– Fasciită necrozantă
	200 mg	comprimate		J01XD01	– Profilaxia chirurgicală
	500 mg	comprimate		J01XD01	– Trichomonaza
	250 mg	comprimate		J01XD01	<i>A DOUA LINIE</i> – Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate)
Nitrofurantoinum	100 mg	comprimate		J01XE01	<i>PRIMA LINIE</i> – Infecții ale tractului urinar inferior
	50 mg	comprimate		J01XE01	

Phenoxymethylpenicillinum	250 mg	comprimat		J01CE02	<i>PRIMA LINIE</i> – Pneumonie comunitară dobândită (ușoară până la moderată)
	250 mg/5ml	pulb./soluție orală		J01CE02	– Faringită – Abces dentar apical progresiv
Procaine benzylpenicillin	1g (= 1 mln ui)	pulbere/sol. inj.		J01CE09	*Procain benzilpenicilina nu este recomandată ca tratament de primă linie pentru sepsisul neonatal, cu excepția cazurilor în care există o mortalitate neonatală ridicată, atunci când este administrată de personal medical instruit în cazurile în care îngrijirea spitalicească nu este posibilă.
	3g (= 3 mln ui)	pulbere/sol. inj.		J01CE09	<i>PRIMA LINIE</i> – Sifilis (congenital) [c] <i>A DOUA LINIE</i> – Sifilis
Spectinomycinum	2 g	pulb./susp. inj.		J01XX04	<i>A DOUA LINIE</i> – Gonoree
Sulfamethoxazole + Trimethoprim	80 mg + 16 mg	sol. inj.		J01EE01	* Trimetoprimul monocomponent poate fi alternativă terapeutică pentru infecția tractului urinar inferior.
	200 mg + 40mg/5 ml	susp. orală		J01EE01	<i>PRIMA LINIE</i>
	100 mg+20 mg	comprimate		J01EE01	– Infecții ale tractului urinar inferior
	400 mg + 80 mg	comprimate		J01EE01	<i>A DOUA LINIE</i>
	800 mg + 160 mg	comprimate		J01EE01	– Diaree acută invazivă / dizenterie bacteriană
Ampicillinum + Sulbactamum	500 mg+250 mg+1.8 ml	pulbere/sol.inj.		J01CR01	* Nu se recomandă utilizarea în combinație cu Sulbactamum din cauza ratelor înalte de rezistență la E. coli.
	1000 mg+ 500 mg +3.5 ml	pulbere/sol.inj.		J01CR01	<i>PRIMA ȘI A DOUA LINIE</i> Tratamentul bolilor infecțioase și inflamatorii cauzate de agenți patogeni sensibili: infecții respiratorii (inclusiv pneumonie, abces pulmonar, bronșită cronică, empiem pleural); infecții ale organelor ORL (inclusiv sinuzită, amigdalită, otită medie); infecții ale tractului urinar și ale organelor genitale (pielonefrită, pielita, cistita, uretrita, prostatita, endometrita); infecții ale tractului biliar (colecistită, colangită); infecții ale pielii și ale țesuturilor moi (erizipel, impetigo, dermatită infectată secundară);
Cefaclorum	125 mg/5 ml	pulb./susp. orală		J01DC04	Tratamentul afecțiunilor inflamatoare ale organelor ORL (rinită, faringită, laringită, etc.).
	250 mg	Forme orale solide		J01DC04	
	500 mg	Forme orale solide		J01DC04	
	250 mg/5 ml 100 ml	granule p/u suspensie orală		J01DC04	
Cefpodoximum	200 mg	comprimate filmate		J01DD13	Infecții ale căilor respiratorii superioare Infecții ale căilor respiratorii inferioare Infecții ale căilor urinare superioare Infecții cutanate și ale țesuturilor moi cauzate de microorganisme sensibile la cefpodoximă, cum sunt abcese, celulita, plăgile infectate, furuncule, foliculita, paronichia, carbuncule și ulcerele trofice.
	100 mg/5 ml	pulbere suspensie orală		J01DD13	Gonoree - uretrită gonococică necomplicată.
6.2.2 Antibiotice din grupul de supraveghere					
Azithromycinum	250 mg	Forme orale solide		J01FA10	<i>PRIMA LINIE</i> – Holera [c] – Febră enterică – Gonoree
	500 mg	Forme orale solide		J01FA10	– Infecție cu transmitere sexuală datorată Chlamydia trachomatis
	200 mg/5ml	pulb./susp. orală		J01FA10	– Trahom
	500 mg	pulb./sol.inj.		J01FA10	– Treponematoze endemice <i>A DOUA ALEGERE</i> – Diaree / dizenterie bacteriană invazivă acută – Gonoree
Cefiximum	400 mg	Forme orale solide		J01DD08	<i>A DOUA LINIE</i>
	200 mg	Forme orale solide		J01DD08	– Diaree / dizenterie bacteriană invazivă acută
	100 mg/5 ml	pulbere/susp.orală		J01DD08	– Gonoree
Cefotaximum	250 mg	pulb./sol. inj.		J01DD01	* A treia generație de cefalosporine la alegere pentru utilizare la nou-născuții spitalizați.
	1000 mg	pulb./sol. inj.		J01DD01	<i>PRIMA LINIE</i> – Meningită bacteriană acută – Pneumonie comunitară dobândită (severă) – Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate) – Infecții intraabdominale complicate (severe) – Pneumonie șăitalicească – Pielonefrită sau prostatită (severă) <i>A DOUA ALEGERE</i> – Infecții osoase și articulare – Pielonefrită sau prostatită (ușoară până la moderată) – Sepsis la nou-născuți și copii [c]
Ceftriaxonum	250 mg	pulb./sol. inj.		J01DD04	* A nu se administra cu calciu și a se evita utilizarea la sugarii cu hiperbilirubinemie. > 41 de săptămâni de vârstă gestațională corectată.
	1 g	pulb./sol. inj.		J01DD04	<i>PRIMA LINIE</i> – Meningită bacteriană acută – Pneumonie comunitară (severă) – Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate) – Infecții intradominale complicate (severe) – Endoftalmită – Febră enterică

	500 mg	pulb./sol. inj.		J01DD04	- Gonoree - Pneumonie dobândită spitalicească - Fasciită necrozantă - Pielonefrită sau prostatita (severă)
	2000 mg	pulb./sol. inj.		J01DD04	<i>A DOUA LINIE</i> - Diaree / dizenterie bacteriană invazivă acută - Infecții osoase și articulare - Pielonefrită sau prostatită (ușoară până la moderată) - Sepsis la nou-născuți și copii [c]
Cefuroximum	750 mg	pulb./sol. inj.		J01DC02	<i>A DOUA LINIE</i> - Profilaxia chirurgicală
	1500 mg	pulb./sol. inj.		J01DC02	
	250 mg	comprimate		J01DC02	
	500 mg	comprimate		J01DC02	
	125 mg/5 ml	granule p/u suspensie orală		J01DC02	
Ciprofloxacinum	2 mg/ml	sol. inj./sol. perf.		J01MA02	<i>PRIMA LINIE</i> - Diaree / dizenterie bacteriană invazivă acută - Febră enterică - Neutropenie febrilă cu risc scăzut - Pielonefrită sau prostatita (ușoară până la moderată) <i>A DOUA LINIE</i> - Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate)
	100 mg/10 ml	sol. perf.		J01MA02	
	400 mg	sol. perf.		J01MA02	
	250 mg	Forme orale solide		J01MA02	
	500 mg	Forme orale solide		J01MA02	
	750 mg	Forme orale solide		J01MA02	
Clarithromycinum	500 mg	Forme orale solide		J01FA09	□ Alternative terapeutice - Eritromycinum *ca tratament de a doua linie pentru faringită la copii †claritromicina este, de asemenea, indicată pentru utilizare în scheme de tratament combinate pentru eradicarea H. pylori la adulți. <i>PRIMA LINIE</i> - Pneumonie comunitară dobândită (severă) <i>A DOUA LINIE</i> - Faringită
	250 mg	Forme orale solide		J01FA09	
	125 mg/5 ml	granule pentru suspensie orală		J01FA09	
	250 mg/5 ml	granule pentru suspensie orală		J01FA09	
	500 mg	pulbere/sol.perf..		J01FA09	

Josamycinum	500 mg	comprimate		J01FA07	Infecții ale tractului respirator superior și ale organelor ORL; difterie; infecții ale tractului respirator inferior; infecții ale cavității bucale; infecții ale pielii și țesuturilor moi; infecții ale tractului urinar și ale organelor genitale
Piperacillinum+ Tazobactamum	4000 mg+500 mg	pulb./sol.inj./perf.		J01CR05	PRIMA LINIE – Infecții intraabdominale complicate (severe) – Neutropenie febrilă cu risc ridicat – Pneumonie dobândită în spital – Fasciită necrozantă
	2000 mg+250 mg	pulb./sol.inj.		J01CR05	A DOUA LINIE
Vancomycinum	500 mg	pulb./sol.perf.		J01XA01	PRIMA LINIE
	1000 mg	pulb./sol.perf.		J01XA01	A DOUA LINIE
	250 mg	comprimate		J01XA01	– Infecții cu C. difficile
	250 mg	pulb./sol. perf.		J01XA01	
	125 mg	capsule		J01XA01	
Lista complementară					
Ceftazidimum	250 mg	pulb./sol. inj.		J01DD02	PRIMA LINIE
	1 g	pulb./sol. inj.		J01DD02	– Endoftalmita
	500 mg	pulb./sol. inj.		J01DD02	A DOUA LINIE
	2000 mg	pulb./sol. inj.		J01DD02	
Meropenemum	500 mg	pulb./sol. inj.		J01DH02	> 3 luni. □ Alternativă terapeutică - Imipenemum + Cilastatinum * Doar în cazul infecțiilor intraabdominale complicate și neutropenie febrilă cu risc ridicat. Meropenemul este terapia de primă linie în cazul meningitei bacteriene acute la nou-născuți.
	1000 mg	pulb./sol. inj.		J01DH02	PRIMA LINIE A DOUA LINIE – Meningită bacteriană acută la nou-născuți [c] – Infecții intraabdominale complicate (severe)
Vancomycinum	250 mg	pulb./sol. perf.		J01XA01	PRIMA LINIE – Endoftalmita – Fasciită necrozantă A DOUA LINIE – Neutropenie febrilă cu risc ridicat
Cefoperazonum	1000 mg	pulb./sol. inj.		J01DD12	Infecții intraabdominale (inclusiv colecistite, angiolite, peritonite), Infecții de tract urinar, Infecții cutanate și ale țesuturilor moi,
	2000 mg	pulb./sol. inj.		J01DD12	Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, Septicemie,

Cefoperazonum+ Sulbactamum	1000 mg+1000 mg	pulb./sol. inj.		J01DD62	Infecții intraabdominale (inclusiv colecistite, angiolite, peritonite), Infecții de tract urinar, Infecții cutanate și ale țesuturilor moi, Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, Septicemie, Infecții ginecologice (inclusiv boală inflamatorie pelvină și endometrite)
Cefepimium	1 g	pulb./sol. inj.		J01DE01	Pneumonie - Infecții ale tractului urinar complicate (inclusiv pielonefrită) - Infecții intra-abdominale complicate - Peritonită asociată dializei la pacienții cu dializă peritoneală ambulatorie continuă (CAPD) Infecții acute ale tractului biliar; - Meningită bacteriană
Lincomycinum	30%	sol. inj.		J01FF02	Tratamentul infecțiilor produse de tulpinile sensibile ale bacteriilor gram pozitive sau gram negative: - infecții ORL, inclusiv tonsilite, faringite, otite medii, sinuzite, mastoidite, scarlatină și ca tratament adjuvant în difterie; - infecții ale căilor respiratorii, inclusiv bronșită acută sau cronică, pneumonii; - infecții ale pielii și țesuturilor moi, inclusiv paniculită, furunculoză, abcese, impetigo, acnee, infecții ale plăgilor, erizipel, limfadenită, panariciu, mastită, gangrena pielii ;
Midecamycinum	250 mg	Forme orale solide		J01FF02	
	400 mg	Forme orale solide		J01FA03	Tratamentul infecțiilor tractului respirator și urogenital, provocate de micoplasme, legionela, chlamidii și Ureaplasma urealyticum- tratamentul infecțiilor respiratorii, cutanate, subcutanate și a altor infecții provocate de bacterii sensibile la midecamicina și penicilina, la pacienții hipersensibili la penicilina- tratamentul enteritei provocate de Campylobacter spp. - tratamentul și profilaxia difteriei și a tusei convulsive.
Myocamicinum	175 mg/5 ml	granule p/u suspensie orală		J01FA11	Infecții ale tractului respirator superior (de exemplu, faringită, amigdalită, otită medie acută, sinuzită acută); infecții ale tractului respirator inferior (de exemplu, bronșită bacteriană acută, agravarea acută a bronșitei cronice, pneumonie); infecții urogenitale, provocate de micoplasme, legionela, chlamidii și Ureaplasma urealyticum;
Norfloxacinum	400 mg	Forme orale solide		J01MA06	Cistita acută Cistita recurentă Infecția acută de tract urinar inferior la bărbați Prostatita bacteriană cronică Gonoree Profilaxia infecțiilor urinare recurente frecvente

6.2.3 Antibiotice din grupul de rezervă

Lista complementară

Cefiderocol	1 g	pulb./sol. inj.		J01DI04	
Ceftazidimum + Avibactamum	2 gr + 0,5 gr	pulb./sol. inj.		J01DD52	
Colistinum	1000000 UI	liof./sol. inj./perf./inh.		J01XB01	
	2000000 UI	pulb./sol. inj./perf./inh.		J01XB01	
Fosfomycin	2 gr	pulb./sol. inj.		J01XX01	
	4 gr	pulb./sol. inj.		J01XX01	
	3 g	granule pentru soluție orală		J01XX01	
Linezolidum	2 mg/ml 300 ml	sol. perf.		J01XX08	
	600 mg	comprimate		J01XX08	
	100 mg/5ml	pulbere pentru lichid oral		J01XX08	
	400 mg	comprimate		J01XX08	
	150 mg	comprimate dispersabile		J01XX08	
Meropenemum+ Vaborbactamum	1 g + 1 g	pulb./sol.inj.		J01DH52	
Plazomicinum	500 mg/10 ml	sol. inj.		J01GB14	
Polymyxinum B	500,000 UI	pulb./sol.inj.		J01XB02	

6.2.4 Medicamente antileproase

Clofaziminum	50 mg	capsule		J04BA01	
	100 mg	capsule		J04BA01	
Dapsonum	25 mg	comprimate		J04BA02	
	50 mg	comprimate		J04BA02	
	100 mg	comprimate		J04BA02	

Rifampicinum	300 mg	capsule		J04AB02	
	150 mg	capsule		J04AB02	
	20 mg/ml	pic. orale, soluție		J04AB02	
	150 mg	capsule		J04AB02	
	300 mg	capsule		J04AB02	
	300 mg	comprimat		J04AB02	
6.2.5 Medicamentele antituberculoase					
Ethambutolum	25 mg/ml	pic. orale, soluție		J04AK02	
	400 mg	comprimat filmat		J04AK02	
	100 mg/ml 10 ml	soluție inj.		J04AK02	
	100 mg	comprimat dispersabil		J04AK02	
Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin	275 mg + 75 mg + 400 mg + 150 mg	comprimat		J04AM06	
Ethambutol+Isoniazid+Rifampicin	275 mg + 75 mg + 150 mg	comprimat		J04AC51	
Isoniazidum	50 mg/5 ml	pic. orale, soluție		J04AC01	
	100 mg	Forme orale solide		J04AC01	
	300 mg	Forme orale solide		J04AC01	
	100 mg	Forme orale solide		J04AC01	
	100 mg/ml	sol. Inj.		J04AC01	
Isoniazidum + pyrazinamidum + rifampicinum	50 mg+ 150 mg+ 75 mg	Forme orale solide		J04AM05	

Rifampicinum + Isoniazidum	50 mg + 75 mg	Forme orale solide		J04AM02	[c]
Rifampicinum + Isoniazidum	75 mg +150 mg	Forme orale solide		J04AM02	
Rifampicinum + Isoniazidum	150 mg + 300 mg	Forme orale solide		J04AM02	
Pyrazinamidum	30 mg/ml	sol. orală		J04AK01	[c]
	400 mg	Forme orale solide		J04AK01	
	500 mg	Forme orale solide		J04AK01	
	150 mg	Forme orale solide		J04AK01	
Rifabutinum	150 mg	Forme orale solide		J04AB04	*Se utilizează doar pacienților infectați cu HIV care administrează inhibitori de protează.
Rifampicinum	300 mg	Forme orale solide		J04AB02	
	150 mg	Forme orale solide		J04AB02	
	20 mg/ml	Pic. orale, soluție		J04AB02	[c]
Rifapentinum	150 mg	comprimate		J04AB05	*Doar în tratamentul formei latente de Tuberculoză
	300 mg	comprimate		J04AB05	
Rifapentinum+ Isoniazidum	300 mg + 300 mg	comprimate		J04AC51	
<i>Medicamentele utilizate în tratamentul Tuberculozei multi-rezistente se recomandă a fi administrate în instituții specializate, respectînd standardele OMS privind controlul TB.</i>					
Amikacinum	500 mg	pulb./sol. inj.		J01GB06	
	1000 mg	pulb./sol. inj.		J01GB06	
	250 mg/ml	pulb./sol. inj.		J01GB06	
	100 mg/2 ml	pulb./sol. inj.		J01GB06	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	250 mg + 62,5 /5ml	pulb./susp. orală		J01CR02	[c] *Doar în asociere cu Meropenemum sau Imipenemum+Cilastatinum
	125 mg + 31,25 /5ml	pulb./susp. orală		J01CR02	[c] *Doar în asociere cu Meropenemum sau Imipenemum+Cilastatinum
	500 mg+125 mg	Forme orale solide		J01CR02	*Doar în asociere cu Meropenemum sau Imipenemum+Cilastatinum
Bedaquilinum	100 mg	Forme orale solide		J04AK05	copii ≥ 5 ani
Clofaziminum	50 mg	Forme orale solide		J04BA01	
	100 mg	Forme orale solide		J04BA01	
Cycloserinum	125 mg	Forme orale solide		J04AB01	[c] *Terizidonum servește ca alternativă.
	250 mg	Forme orale solide		J04AB01	*Terizidonum servește ca alternativă.
Delamanidum	25 mg	Forme orale solide		J04AK06	*Copii≥ 3 ani
	50 mg	Forme orale solide		J04AK06	*Copii≥ 6 ani
Ethionamidum	125 mg	Forme orale solide		J04AD03	[c] *Protonamidum servește ca alternativă protonamide.
	250 mg	Forme orale solide		J04AD03	[c] *Protonamidum servește ca alternativă protonamide.
	125 mg	Forme orale solide		J04AD03	[c] *Protonamidum servește ca alternativă protonamide.
Levofloxacinum	250 mg	Forme orale solide		J01MA12	
	500 mg	Forme orale solide		J01MA12	
	750 mg	Forme orale solide		J01MA12	
	100 mg	Forme orale solide		J01MA12	
	0,50%	sol. perf.		J01MA12	
Linezolidum	2 mg/ml 300 ml	sol. perf.		J01XX08	
	600 mg	Forme orale solide		J01XX08	
	100 mg/5ml	pulbere/sol. orală		J01XX08	
	150 mg	Forme orale solide		J01XX08	
Meropenemum	500 mg	pulb./sol.inj.		J01DH02	□ Imipenemum+Cilastatinum servește ca alternativă.
	1000 mg	pulb./sol.inj.		J01DH02	
Moxifloxacinum	400 mg	Forme orale solide		J01MA14	
	400 mg	sol. perf.		J01MA14	
	100 mg	comprimate dispersabile		J01MA14	
Acid p-aminosalicilic	4 g	Forme orale solide		J04AA01	
Streptomycinum	1 g	pulb./sol. inj.		J01GA01	[c]

6.3 Medicamente antifungice					
Amphotericinum B	50 mg	pulb./sol. inj.		J02AA01	
	100 mg/ml	suspensie orală		J02AA01	
Clotrimazolum	1%	cremă vaginală		G01AF02	
	10%	cremă vaginală		G01AF02	
	100 mg	comprimate vaginale		G01AF02	
	500 mg	comprimate vaginale		G01AF02	
	1%	soluție cutanată		D01AC01	
	1%	cremă		D01AC01	
	Betamethasonum+ Clotrimazolum+ Gentamicinum	0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g	unguent		D07CC01
0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g		crema		D07CC01	
Fluconazolum	50 mg	capsule, comprimate		J02AC01	
	2 mg/ml	sol. inj.		J02AC01	
	50 mg/5 ml	pic. orale, soluție		J02AC01	
	100 mg	capsule, comprimate		J02AC01	
	150 mg	capsule, comprimate		J02AC01	
	200 mg	capsule, comprimate		J02AC01	
Flucytosinum	250 mg	Capsule		J02AX01	
	2,5 g/ 250 ml	sol. perf.		J02AX01	
Griseofulvinum	125 mg/5 ml	pic. orale, soluție		D01BA01	
	125 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		D01BA01	
	250 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		D01BA01	
Itraconazolum	100 mg	capsule, comprimate		J02AC02	*În tratamentul aspergilozei pulmonare cronice, histoplasmozei, sporotricozei, paracoccidioidomicozei, micozei cauzate de T. Marneffei și cromoblastomicozei și în profilaxia histoplasmozei și infecțiilor cauzate de T. Marneffei la pacienții cu SIDA.
	10 mg/ml	solutie orală		J02AC02	
Nystatinum	50 mg/5 ml	solutie orală		G01AA01	[c]
	100 000 IU/ml	solutie orală		G01AA01	[c]
	100 000 IU	comprimate		G01AA01	
	500 000 IU	comprimate		G01AA01	
	100 000 IU	ovule		G01AA01	
	500 000 UI	ovule		G01AA01	
	100000 UI/g	unguent		D01AA01	
Voriconazolum	50 mg	comprimate		J02AC03	*În tratamentul aspergilozei pulmonare cronice și aspergilozei invazive acute.
	200 mg	comprimate		J02AC03	*În tratamentul aspergilozei pulmonare cronice și aspergilozei invazive acute.
	200 mg (per flacon)	pulb./sol. inj.		J02AC03	*În tratamentul aspergilozei pulmonare cronice și aspergilozei invazive acute.
	40 mg/ml	pulb./sol. orala		J02AC03	*În tratamentul aspergilozei pulmonare cronice și aspergilozei invazive acute.
Lista complementară					
Micafunginm	50 mg	pulb. /sol.inj.			□ Alternative terapeutice - Anidulafunginum, Caspofunginun
	100 mg	pulb. /sol.inj.			□ Alternative terapeutice - Anidulafunginum, Caspofunginun
Potassium iodide	Nu este specificată doza			V03AB21	Soluție saturată
6.4 Medicamente antivirale					
6.4.1 Medicamente antiherpes					
Aciclovirum	200 mg/5 ml	sol. orală		J05AB01	□ Alternative terapeutice - Valaciclovirum (oral)
	250 mg	pulb./sol. inj./perf.		J05AB01	
	200 mg	Forme solide orale		J05AB01	
	5%	crema		D06BB03	
6.4.2 Antiretrovirale					
6.4.2.1 Inhibitori ai nucleozidelor / nucleotidelor de transcriptază inversă					
Abacavirum	300 mg	Forme solide orale		J05AF06	
	60 mg	Forme solide orale		J05AF06	[c]

Lamivudinum	50 mg/5 ml	pic. orale, soluție		J05AF05	[c]
	150 mg	Forme solide orale		J05AF05	
	100 mg	Forme solide orale		J05AF05	
	10 mg/ml	sol. orală		J05AF05	
Tenofovir disoproxil fumaras	300 mg	Forme solide orale		J05AF07	* Echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil; **Este indicat de asemenea în profilaxia pre-expunere.
Zidovudinum	250 mg	Forme solide orale		J05AF01	
	50 mg/5 ml	sol. orală		J05AF01	
	10 mg/ml	sol. inj./perf.		J05AF01	
	300 mg	Forme solide orale		J05AF01	
	100 mg	Forme solide orale		J05AF01	
6.4.2.2 Inhibitori non-nucleozidici ai transcriptazei inverse					
Efavirenzum	200 mg	Forme solide orale		J05AG03	*Copii> 3 ani sau cu masa corporală >10 kg
	600 mg	Forme solide orale		J05AG03	*Copii> 3 ani sau cu masa corporală >10 kg
Nevirapinum	50 mg/5 ml	Forme orale lichide		J05AG01	*Copii> 6 luni
	50 mg	Forme solide orale		J05AG01	*Copii> 6 luni
	200 mg	Forme solide orale		J05AG01	*Copii> 6 luni
6.4.2.3 Inhibitori de protează					
Ritonavirum se recomandă a fi administrat în combinații, în calitate de "booster" farmacologic și nu reprezintă un antiretroviral de sine stătător. Ceilalți inhibitori de protează se recomandă a fi utilizați în forme combinate cu "boosteri" farmacologici (ca de ex.					
Atazanavirum + Ritonavirum	300 mg +100 mg	comprimate		J05AR	
Darunavirum	75 mg	comprimate		J05AE10	*Copii> 3 ani
	400 mg	comprimate		J05AE10	*Copii> 3 ani
	600 mg	comprimate		J05AE10	*Copii> 3 ani
	800 mg	comprimate		J05AE10	*Copii> 3 ani
Lopinavirum + Ritonavirum	80 mg+20 mg/ml	Forme orale lichide		J05R10	
	40 mg+10 mg/ml	Forme orale lichide		J05R11	
	100 mg + 25 mg	comprimate		J05R10	
	200 mg + 50 mg	comprimate		J05R10	
	40 mg + 10 mg	Forme orale solide		J05R10	[c]
Ritonavirum	25 mg	Forme orale solide		J05AE03	
	100 mg	Forme orale solide		J05AE03	

6.4.2.4 Inhibitori ai integrazei

Dolutegravirum	10 mg	Forme orale solide		J05AX12	*Copii cu masa corporală ≥ 3 kg și ≥ 4 săptămâni
Dolutegravirum	50 mg	Forme orale solide		J05AX12	*Copii cu masa corporală ≥ 25 kg
Raltegravirum	25 mg	Forme orale solide		J05AR	*Pentru administrare gravidelor și în curele de tratament de linia a doua, în conformitate cu Ghidurile de
	400 mg	Forme orale solide		J05AR	de linia a doua, în conformitate cu Ghidurile de
	100 mg	granule/susp. orală		J05AR	tratament ale OMS.

6.4.2.5 Combinații cu doză fixă de medicamente antiretrovirale

Abacavirum + Lamivudinum	120 mg + 60 mg	Forme orale solide		J05AF06	
	600 mg + 300 mg	Forme orale solide		J05AR02	
Tenofoviri disoproxili fumaras + Lamivudinum + Dolutegravirum	300mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil) +300mg+50mg	Forme orale solide		J05AR	
Efavirenzum+ Emtricitabinum + Tenofoviri disoproxili fumaras	600 mg + 200 mg + 300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil)	Forme orale solide		J05AR06	*Emtricitabina este o alternativă acceptabilă Lamivudinei.
Tenofoviri disoproxili fumaras+ Lamivudinum+ Efavirenzum	300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil) +300 mg+400 mg	Forme orale solide		J05AR11	
Tenofoviri disoproxili fumaras + Lamivudinum + Efavirenzum	300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil) + 300 mg+ 400 mg	Forme orale solide			
	300 mg + 300 mg+ 600 mg	Forme orale solide		J05AR11	
Emtricitabinum+ Tenofoviri disoproxili fumaras	200 mg + 300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil)	Forme orale solide		J05AR03	Emtricitabina este o alternativă acceptabilă Lamivudinei. Combinația dintre Emtricitabina și Tenofovir este indicată, de asemenea, în profilaxia pre-expunere
Lamivudinum + Zidovudinum	30 mg + 60 mg	Forme orale solide		J05AR01	[c]
	150 mg + 300 mg	Forme orale solide		J05AR01	

6.4.2.6 Medicamente pentru prevenirea infecțiilor oportuniste legate de HIV

Isoniazid + pyridoxine + sulfamethoxazole + trimethoprim	300 mg + 25 mg + 800 mg + 160 mg	comprimate secabile		J04AM08	
---	----------------------------------	---------------------	--	---------	--

6.4.3 Alte antivirale

Ribavirinum	800 mg în 10 ml soluție tampon fosfat	sol. inj./perf.		J05AP01	
	1 g în 10 ml soluție tampon fosfat	sol. inj./perf.		J05AP01	
	200 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		J05AP01	
	400 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		J05AP01	
	600 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		J05AP01	
Valganciclovirum	450 mg	comprimate		J05AB14	
Ganciclovirum	500 mg	pulb. liof./sol. perf.		J05AB06	

Lista complementară

Oseltamivirum	30 mg	capsule		J05AH02	*Maladie severă a cărei cauză suspectată sau confirmată este virul gripal în cazul pacienților spitalizați în stare critică
	45 mg	capsule		J05AH02	*Maladie severă a cărei cauză suspectată sau confirmată este virul gripal în cazul pacienților spitalizați în stare critică
	75 mg	capsule		J05AH02	*Maladie severă a cărei cauză suspectată sau confirmată este virul gripal în cazul pacienților spitalizați în stare critică
Valganciclovirum	450 mg	comprimate		J05AB14	
Ganciclovirum	500 mg	pulb. liof./sol. perf.		J05AB06	
Remdesivirum	100 mg	Pulb./Conc./sol.perf.		J05AB16	

6.4.4 Medicamentele împotriva hepatitei

6.4.4.1 Medicamente împotriva virusului hepatitic B

6.4.4.1.1 Inhibitori nucleozidici / nucleotidici ai transcriptazei inverse

Entecavirum	0.05 mg/ml	soluție orală		J05AF10	
	0.5 mg	comprimate		J05AF10	
	1 mg	comprimate		J05AF10	
Tenofovir disoproxili fumaras	300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil)	comprimate		J05AF07	

6.4.4.2 Medicamente împotriva virusului hepatitic C

6.4.4.2.1 Antivirale pangenotipice cu acțiune directă

Daclatasvirum	30 mg	comprimate		J05AX14	*Pangenotipic în caz de asociere cu Sofosbuvirum.
	60 mg	comprimate		J05AX14	*Pangenotipic în caz de asociere cu Sofosbuvirum.
Glecaprevirum+ Pibrentasvirum	100 mg+40 mg	comprimate		J05AP57	
	50 mg +20 mg	granule pentru sol. orală			[c]
Sofosbuvirum	200 mg	Comprimate		J05AP08	*Pangenotipic în caz de asociere cu Daclatasvirum.
	400 mg	Comprimate		J05AP08	*Pangenotipic în caz de asociere cu Daclatasvirum.
Sofosbuvirum + Velpatasvirum	200 mg + 50 mg	Comprimate		J05AP55	
	400 mg + 100 mg	Comprimate		J05AP55	

6.4.4.2.2 Antivirale nepangenotipice cu acțiune directă (doar pentru adulți)

Dasabuvirum	250 mg	Comprimate		J05AP09	
Ledipasvirum + Sofosbuvirum	90 mg + 400 mg	Comprimate		J05AX	
Ombitasvirum+ Paritaprevirum+ Ritonavirum	12.5 mg + 75 mg + 50 mg	Comprimate		J05AP53	

6.4.4.2.3 Alte antivirale împotriva virusului hepatitic C (doar pentru adulți)

Ribavirinum	800 mg în 10 ml soluție tampon fosfat	sol. inj./perf.		J05AP01	*În tratamentul virusului hepatitic C, în asociere cu medicamente antivirale cu acțiune directă
	1 g în 10 ml soluție tampon fosfat	sol. inj./perf.		J05AP01	*În tratamentul virusului hepatitic C, în asociere cu medicamente antivirale cu acțiune directă
	200 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		J05AP01	*În tratamentul virusului hepatitic C, în asociere cu medicamente antivirale cu acțiune directă
	400 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		J05AP01	*În tratamentul virusului hepatitic C, în asociere cu medicamente antivirale cu acțiune directă
	600 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		J05AP01	*În tratamentul virusului hepatitic C, în asociere cu medicamente antivirale cu acțiune directă

Lista complementară					
Peginterferonum alfa-2a	180 mcg	Sol. Inj. în seringă preumplută sau flacon		L03AB11	*A se utiliza în asociere cu Ribavirinum.
	135 mcg	Sol. Inj. în seringă preumplută		L03AB11	*A se utiliza în asociere cu Ribavirinum.
Peginterferonum alfa-2b	80 mcg	Sol. Inj. în seringă preumplută sau flacon		L03AB11	*A se utiliza în asociere cu Ribavirinum.
	100 mcg	Sol. Inj. în seringă preumplută sau flacon		L03AB11	*A se utiliza în asociere cu Ribavirinum.
Interferonum alfa-2a	3 MUI	Sol. Inj. în seringă preumplută		L03AB04	
6.5 Medicamente antiprotozoice					
6.5.1 Medicamente antiamebice și anti giardioze					
Diloxanidum	500 mg	comprimate		P01AC01	*Copii cu masa corporală >25 kg
Metronidazolum	500 mg/100 ml	sol. perf.		P01AB01	☐ Alternativă terapeutică - Tinidazol
	250 mg	comprimate		P01AB01	☐ Alternativă terapeutică - Tinidazol
	400 mg	comprimate		P01AB01	☐ Alternativă terapeutică - Tinidazol
	500 mg	comprimate		P01AB01	☐ Alternativă terapeutică - Tinidazol
	500 mg	supozitoare		P01AB01	☐ Alternativă terapeutică - Tinidazol
	1000 mg	supozitoare		P01AB01	☐ Alternativă terapeutică - Tinidazol
6.5.4 Medicamente antipneumocistozice și antitoxoplasmozie					
Albendazolum	200 mg	comprimate, comprimate dispersabile			
	400 mg	comprimate, comprimate dispersabile		P02CA03	
	40 mg/ml	suspensie orală		P02CA03	
Pyrimethaminum	25 mg	comprimate		P01BD01	
Sulfadiazinum	500 mg	comprimate		J01EC02	
Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	80 mg + 16 mg/ml	sol. inj.		J01EE01	
	200 mg + 40mg/5 ml	Forme orale lichide		J01EE01	[c]
	100 mg+20 mg	comprimate		J01EE01	
	400 mg + 80 mg	comprimate		J01EE01	[c]
	800 mg + 160 mg	comprimate		J01EE01	

Lista complementară					
Pentamidinum	200 mg	comprimate		P01CX01	
	300 mg	comprimate		P01CX01	
6.6 Medicamente pentru infecții ectoparazitare					
Benzylii benzoas	20%	forme de uz extern		P03AX01	
	27,7%	forme de uz extern		P03AX01	
7. Medicamente antimigrenoase					
7.1 Pentru tratamentul atacului acut					
Acidum acetylsalicylicum	325 mg	comprimate		N02BA01	
	500 mg	comprimate		N02BA01	
Ibuprofenum	200 mg	Forme orale solide		M01AE01	[c]
	400 mg	Forme orale solide		M01AE01	[c]
	100 mg/5 ml	Forme orale lichide		M01AE01	[c]
	200 mg/5 ml	Forme orale lichide		M01AE01	[c]
Paracetamolum	120 mg/5 ml	Forme orale lichide		N02BE01	[c]
	125 mg/5 ml	Forme orale lichide		N02BE01	[c]
	300 mg	comprimate		N02BE01	
	500 mg	comprimate		N02BE01	
Sumatriptanum	50 mg	comprimate		N02CC01	
7.2 Pentru profilaxie					
Propranololum	20 mg	comprimate		C07AA05	☐
	40 mg	comprimate		C07AA05	☐
8. Imunomodulatoare și antineoplazice					
8.1 Imunomodulatoare pentru boală non-malignă					
Lista complementară					
Adalimumabum	40 mg/0.4 ml	sol. inj.		L04AB04	*Certolizumabum pegol, Etanercept, Golimumabum, Infliximabum și medicamentele biosimilare ale acestora, evaluate din perspectiva calității, servesc ca alternative
	40 mg/0.8 ml	sol. inj.		L04AB04	*Certolizumabum pegol, Etanercept, Golimumabum, Infliximabum și medicamentele biosimilare ale acestora, evaluate din perspectiva calității, servesc ca alternative

Azathioprinum	100 mg	pulb./sol. inj.		L04AX01	
Azathioprinum	50 mg	comprimate, comprimate secabile		L04AX01	
Ciclosporinum	25 mg	capsule		L04AD01	
Ciclosporinum	50 mg	capsule		L04AD01	
8.2 Antineoplastice și medicamente de susținere					
8.2.1 Medicamente citotoxice					
<i>Lista complementară</i>					
Arsenicum trioxydum	1 mg/ml	Concentrat/sol. perf.		L01XX27	*Leucemie promielocitică acută
Asparaginasum	10 000 UI	pulb./sol. inj.		L01XX02	*Leucemie limfoblastică acută **Inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
Bendamustinum	45 mg/0.5 ml	sol. inj.		L01AA09	*Leucemie limfocitică cronică și limfom folicular
	100 mg	pulb./conc./sol. perf.		L01AA09	
Bleomycinum	15 UI	pulb./sol. inj.		L01DC01	*Limfom Hodgkin, Sarcom Kaposi, Tumori ovariene cu celule germinale, Tumori testiculare cu celule germinale
Calcium folinatum (Leucovorinum)	30 mg/3 ml	sol. inj.		V03AF03	*Cancer de colon în stadiu incipient, cancer rectal în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, cancer colorectal metastatic, osteosarcom, limfom Burkitt
	5 mg	comprimate		V03AF03	*Cancer de colon în stadiu incipient, cancer rectal în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, cancer colorectal metastatic, osteosarcom, limfom Burkitt
	15 mg	comprimate		V03AF03	*Cancer de colon în stadiu incipient, cancer rectal în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, cancer colorectal metastatic, osteosarcom, limfom Burkitt
	25 mg	comprimate		V03AF03	*Cancer de colon în stadiu incipient, cancer rectal în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, cancer colorectal metastatic, osteosarcom, limfom Burkitt
Capecitabinum	150 mg	comprimate		L01BC06	stadiu incipient, Cancer de sân metastatic, Cancer colorectal metastatic
	500 mg	comprimate		L01BC06	stadiu incipient, Cancer de sân metastatic, Cancer colorectal metastatic
Carboplatinum	50 mg/5 ml	conc./sol. perf.		L01XA02	*Cancer de sân în stadiu incipient, cancer ovarian epitelial, cancer nazofaringian, cancer pulmonar fără celule mici, osteosarcom, retinoblastom, cancer de col uterin
	150 mg/15 ml	conc./sol. perf.		L01XA02	*Cancer de sân în stadiu incipient, cancer ovarian epitelial, cancer nazofaringian, cancer pulmonar fără celule mici, osteosarcom, retinoblastom, cancer de col uterin
	450 mg/45 ml	conc./sol. perf.		L01XA02	*Cancer de sân în stadiu incipient, cancer ovarian epitelial, cancer nazofaringian, cancer pulmonar fără celule mici, osteosarcom, retinoblastom, cancer de col uterin
	600 mg/60 ml	conc./sol. perf.		L01XA02	*Cancer de sân în stadiu incipient, cancer ovarian epitelial, cancer nazofaringian, cancer pulmonar fără celule mici, osteosarcom, retinoblastom, cancer de col uterin
Chlorambucilum	2 mg	comprimate		L01AA02	*Leucemie limfocitică cronică
Cisplatinum	1 mg/ml	sol. inj.		L01XA01	*Cancer de col uterin, cancer de cap și gât (ca radiosensibilizant), cancer nazofaringian (ca radiosensibilizator), cancer pulmonar fără celule mici, osteosarcom, tumoră cu celule germinale ovariene, tumoră cu celule germinale testiculare
Cyclophosphamidum	200 mg	pulb./sol.inj		L01AA01	*Leucemie limfocitară cronică, Limfom difuz cu celule B mari, cancer de sân în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, limfom folicular, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt, cancer de sân metastatic, mielom multiplu
	500 mg	pulb./sol.inj		L01AA01	*Leucemie limfocitară cronică, Limfom difuz cu celule B mari, cancer de sân în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, limfom folicular, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt, cancer de sân metastatic, mielom multiplu
	1000 mg	pulb./sol.inj		L01AA01	*Leucemie limfocitară cronică, Limfom difuz cu celule B mari, cancer de sân în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, limfom folicular, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt, cancer de sân metastatic, mielom multiplu
	2000 mg	pulb./sol.inj		L01AA01	*Leucemie limfocitară cronică, Limfom difuz cu celule B mari, cancer de sân în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, limfom folicular, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt, cancer de sân metastatic, mielom multiplu
Cyproteronum	50 mg	comprimate		G03HA01	

Cytarabinum	100 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01BC01	*Leucemie mieloidă acută, Leucemie acută limfoblastică, Leucemie acută promielocitară, Limfom Burkitt
	100 mg/5 ml	sol. inj.		L01BC01	*Leucemie mieloidă acută, Leucemie acută limfoblastică, Leucemie acută promielocitară, Limfom Burkitt
	1000 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01BC01	*Leucemie mieloidă acută, Leucemie acută limfoblastică, Leucemie acută promielocitară, Limfom Burkitt
Dacarbazinum	100 mg/flacon	pulb./sol. inj./perf.		L01AX04	*Limfom Hodgkin
	200 mg/flacon	pulb./sol. inj./perf.		L01AX04	*Limfom Hodgkin
Dactinomycinum	500 mcg/flacon	pulb./sol. inj.		L01DA01	*Neoplazie trofoblastică gestațională, rabdomiosarcom, nefroblastom (tumora Wilms)
Daunorubicinum	50 mg	pulb./sol. inj.		L01DB02	*Leucemie limfoblastică acută, Leucemie mieloidă acută, Leucemie acută promielocitară
Docetaxelum	20 mg/ml	sol. inj., Conc./sol. perf.		L01CD02	*Cancer de sân în stadiu incipient, Cancer de sân metastatic, Cancer de prostată metastatic
	40 mg/ml	sol. inj., Conc./sol. perf.		L01CD02	*Cancer de sân în stadiu incipient, Cancer de sân metastatic, Cancer de prostată metastatic
Doxorubicinum	10 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01DB01	*Limfom difuz cu celule B mari, cancer mamar în stadiu incipient, limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, limfom folicular, cancer mamar metastatic, osteosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, nefroblastom (tumoare Wilms), limfom Burkitt, mielom multiplu.
	50 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01DB01	*Limfom difuz cu celule B mari, cancer mamar în stadiu incipient, limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, limfom folicular, cancer mamar metastatic, osteosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, nefroblastom (tumoare Wilms), limfom Burkitt, mielom multiplu.
	2 mg/ml	sol. inj.		L01DB01	*Limfom difuz cu celule B mari, cancer mamar în stadiu incipient, limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, limfom folicular, cancer mamar metastatic, osteosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, nefroblastom (tumoare Wilms), limfom Burkitt, mielom multiplu.
Epirubicinum	10 mg	Pulb./sol. inj./perf.		L01DB03	
Etoposidum	50 mg	capsule		L01CB01	* Tumoare testiculară cu celule germinale, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, cancer pulmonar cu celule mici, tumoră ovariană cu celule germinale, retinoblastom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt
	100 mg	capsule		L01CB01	* Tumoare testiculară cu celule germinale, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, cancer pulmonar cu celule mici, tumoră ovariană cu celule germinale, retinoblastom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt
	100 mg/5 ml	conc./sol. perf.		L01CB01	* Tumoare testiculară cu celule germinale, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, cancer pulmonar cu celule mici, tumoră ovariană cu celule germinale, retinoblastom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt
Fludarabinum	50 mg/flacon	pulb./sol.inj		L01BB05	*Leucemie limfocitică cronică
	10 mg	comprimate		L01BB05	*Leucemie limfocitică cronică
Fluorouracilum	50 mg/ml	sol. inj.		L01BC02	*Cancer de sân în stadiu incipient, cancer de colon în stadiu incipient, cancer rectal în stadiu incipient, cancer colorectal metastatic, cancer nazofaringian
Gemcitabinum	200 mg/flacon	pulb./sol. perf.		L01BC05	*Cancer ovarian epitelial, Cancer pulmonar fără celule mici
	1 g/flacon	pulb./sol. perf.		L01BC05	*Cancer ovarian epitelial, Cancer pulmonar fără celule mici
Hydroxycarbamidum	200 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		L01XX05	*Leucemie mieloidă cronică
	250 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		L01XX05	*Leucemie mieloidă cronică
	300 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		L01XX05	*Leucemie mieloidă cronică
	400 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		L01XX05	*Leucemie mieloidă cronică
	500 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		L01XX05	*Leucemie mieloidă cronică
	1000 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		L01XX05	*Leucemie mieloidă cronică

Ifosfamidum	500 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01AA06	*Tumori ale celulelor germinale testiculare, Tumori ale celulelor germinale ovariene, Osteosarcom, Rbdomiosarcom, Sarcom Ewing
	1 g/flacon	pulb./sol. inj.		L01AA06	*Tumori ale celulelor germinale testiculare, Tumori ale celulelor germinale ovariene, Osteosarcom, Rbdomiosarcom, Sarcom Ewing
	2 g/per flacon	pulb./sol. inj.		L01AA06	*Tumori ale celulelor germinale testiculare, Tumori ale celulelor germinale ovariene, Osteosarcom, Rbdomiosarcom, Sarcom Ewing
Irinotecanum	40 mg/2 ml	pulb./sol. perf.		L01XX19	*Cancer colorectal metastatic.
	100 mg/5 ml	pulb./sol. perf.		L01XX19	*Cancer colorectal metastatic.
	500 mg/25 ml	pulb./sol. perf.		L01XX19	*Cancer colorectal metastatic.
Melphalanum	50 mg	pulb./sol. inj.		L01AA03	*Mielom multiplu
	2 mg	comprimate		L01AA03	*Mielom multiplu
Mercaptopurinum	50 mg	comprimate		L01BB02	*Leucemie limfoblastică acută, leucemie promielocitică acută
Methotrexatum	50 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L04AX03	* Cancer de sân în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, osteosarcom, leucemie
	2.5 mg	comprimate		L04AX03	* Cancer de sân în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, osteosarcom, leucemie limfoblastică acută, leucemie acută promielocitară
Mitomycinum	20 mg	pulb./sol. inj.		L01DC03	
Mitoxantronum	20 mg	Conc./sol. inj./perf.		L01DB07	
Oxaliplatinum	5 mg/ml	sol. inj./perf.		L01XA03	*Cancer de colon în stadiu incipient, Cancer colorectal metastatic
	50 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01XA03	*Cancer de colon în stadiu incipient, Cancer colorectal metastatic
	100 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01XA03	*Cancer de colon în stadiu incipient, Cancer colorectal metastatic
Paclitaxelum	6 mg/ml	pulb./sol. inj./perf., Conc./sol. inj./perf.		L01CD01	* Cancer ovarian epitelial, Cancer de sân în stadiu incipient, Cancer de sân metastatic, Sarcom Kaposi, Cancer nazofaringian, Cancer pulmonar cu celule mici,
Pegaspargasum	750 UI/ml	sol. inj.		L01XX24	*Leucemie limfoblastică acută **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
Procarbazinum	50 mg	capsule, comprimate		L01XB01	[c] *Limfom Hodgkin

Realgar-Indigo naturalis	270 mg (cu continut de 30 mg tetrafulfură de tetraarsenic)	comprimate			*Leucemie promielocitică acută
Tegafurum	400 mg	capsule		L01BC03	
Temozolomidum	5 mg	capsule		L01AX03	
	20 mg	capsule		L01AX03	
	100 mg	capsule		L01AX03	
	250 mg	capsule		L01AX03	
Tioguaninum	40 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		L01BB03	*Leucemie limfoblastică acută
Tretioninum	10 mg	capsule		L01XX14	
Vinblastinum	10 mg	pulb./sol. inj., sol. inj.		L01CA01	celulelor germinale testiculare, Tumori ale celulelor germinale ovariene
Vincristinum	1 mg/ml	sol. inj.		L01CA02	gestațională, limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, limfom folicular, retinoblastom, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, nefroblastom (tumora Wilms), limfom Burkitt
	1 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01CA02	gestațională, limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, limfom folicular, retinoblastom, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, nefroblastom (tumora Wilms), limfom Burkitt
	5 mg/flacon	pulb./sol. inj.		L01CA02	gestațională, limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, limfom folicular, retinoblastom, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, nefroblastom (tumora Wilms), limfom Burkitt
Vinorelbinum	20 mg	capsule		L01CA04	* Cancer pulmonar cu celule mici, cancer de sân metastatic
	30 mg	capsule		L01CA04	* Cancer pulmonar cu celule mici, cancer de sân metastatic
	80 mg	capsule		L01CA04	* Cancer pulmonar cu celule mici, cancer de sân metastatic
	10 mg/1 ml	conc./sol. perf./inj.,		L01CA04	metastatic
	50 mg/5 ml	conc./sol. perf./inj.,		L01CA04	metastatic
8.2.2 Terapii țintite					
Basiliximabum	20 mg	pulb./sol. inj./perf.		L04AC02	
Bevacizumabum	25 mg/ml	conc./sol. perf.		L01XC07	
Golimumabum	45 mg/0,45 ml	sol. inj.		L04AB06	
	50 mg/0,5 ml	sol. inj.		L04AB06	
Pertuzumabum	420 mg	conc./sol. perf.		L01XC13	
Tocilizumabum	20 mg/ml	sol. inj.		L04AC07	

Lista complementară					
Acidum all-trans retinoidum	10 mg	capsule		L01XF	*Leucemie promielocitică acută.
Bortezomibum	3.5 mg	pulbere/sol.inj.		L01XX32	*Mielom multiplu
Dasatinibum	20 mg	comprimate		L01EA02	Imatinib.
	50 mg	comprimate		L01EA02	Imatinib.
	70 mg	comprimate		L01EA02	Imatinib.
	80 mg	comprimate		L01EA02	Imatinib.
	100 mg	comprimate		L01EA02	Imatinib.
	140 mg	comprimate		L01EA02	Imatinib.
Erlotinibum	100 mg	comprimate		L01XE03	□ Alternative terapeutice - Afatinibum, Gefitinibum *Cancer pulmonar avansat fără celule mici, pozitiv
	150 mg	comprimate		L01XE03	□ Alternative terapeutice - Afatinibum, Gefitinibum *Cancer pulmonar avansat fără celule mici, pozitiv
Imatinibum	100 mg	comprimate		L01EA01	*Leucemie mieloidă cronică și tumoare stromală gastrointestinală.
	400 mg	comprimate		L01EA01	*Leucemie mieloidă cronică și tumoare stromală gastrointestinală.
Nilotinibum	150 mg	capsule		L01EA03	*Leucemie mieloidă cronică rezistentă la tratamentul cu Imatinib.
	200 mg	capsule		L01EA03	*Leucemie mieloidă cronică rezistentă la tratamentul cu Imatinib.
Everolimus	0.75 mg	comprimate		L04AA18	*Astrocitomă cu celule gigante subependimale
	2.5 mg	comprimate		L04AA18	*Astrocitomă cu celule gigante subependimale
	5 mg	comprimate		L04AA18	*Astrocitomă cu celule gigante subependimale
	7.5 mg	comprimate		L04AA18	*Astrocitomă cu celule gigante subependimale
	10 mg	comprimate		L04AA18	*Astrocitomă cu celule gigante subependimale
	2 mg	comprimate		L04AA18	*Astrocitomă cu celule gigante subependimale
	3 mg	comprimate		L04AA18	*Astrocitomă cu celule gigante subependimale
Ibrutinibum	140 mg	capsule		L01XE27	*Leucemie limfocitară cronică recidivantă/refractară la tratament.
Imatinibum	100 mg	Forme orale solide		L01EA01	gastrointestinală, Leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv
	400 mg	Forme orale solide		L01EA01	gastrointestinală, Leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv
Nilotinibum	150 mg	capsule		L01EA03	Imatinib.
	200 mg	capsule		L01EA03	Imatinib.
Rituximabum	100 mg/10 ml	sol. inj./perf.		L01XC02	cronică, Limfom folicular. **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
	500 mg/50 ml	sol. inj./perf.		L01XC02	cronică, Limfom folicular. **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității

Sorafenibum	200 mg	comprimate		L01EX02	
Tacrolimus	0.1 mg	Forme orale solide		L04AD02	
	1 mg	Forme orale solide		L04AD02	
	4 mg	Forme orale solide		L04AD02	
	5 mg	Forme orale solide		L04AD02	
Trastuzumabum	60 mg	pulb./sol. perf.		L01XC03	cancer de sân metastatic HER2 pozitiv. **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
	150 mg	pulb./sol. perf.		L01XC03	cancer de sân metastatic HER2 pozitiv. **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
	440 mg	pulb./sol. perf.		L01XC03	cancer de sân metastatic HER2 pozitiv. **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
	600 mg	sol. Inj.		L01XC03	cancer de sân metastatic HER2 pozitiv. **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
Vemurafenibum	240 mg	comprimate		L01EX02	

8.2.3 Imunomodulatori

Lista complementară

Acidum mycophenolicum	180 mg	comprimate		L04AA06	
	360 mg	comprimate		L04AA06	
Mycophenolatum mofetilum	250 mg	capsule		L04AA06	
	500 mg	comprimate		L04AA06	
Filgrastimum	120 mcg/0.2 ml	sol. inj. În ser. preum.		L03AA02	dezvoltare a neutropeniei febrile asociate terapiei mielotoxice; în profilaxia secundară a pacienților cu istoric de neutropenie dezvoltată ca urmare a terapiei mielotoxice; pentru facilitarea administrării regimurilor de chemoterapie în doze dense
Filgrastimum	30 MUI (300 mcg)/0,5 ml	sol. inj. În ser. preum.		L03AA02	dezvoltare a neutropeniei febrile asociate terapiei mielotoxice; în profilaxia secundară a pacienților cu istoric de neutropenie dezvoltată ca urmare a terapiei mielotoxice; pentru facilitarea administrării regimurilor de chemoterapie în doze dense
Filgrastimum	480 mcg/0.8 ml	sol. inj. În ser. preum.		L03AA02	dezvoltare a neutropeniei febrile asociate terapiei mielotoxice; în profilaxia secundară a pacienților cu istoric de neutropenie dezvoltată ca urmare a terapiei mielotoxice; pentru facilitarea administrării regimurilor de chemoterapie în doze dense

Filgrastimum	300 mcg/1 ml	sol. inj. in flacon		L03AA02	*În profilaxia primară a pacienților cu risc înalt de dezvoltare a neutropeniei febrile asociate terapiei mielotoxice; în profilaxia secundară a pacienților cu istoric de neutropenie dezvoltată ca urmare a terapiei mielotoxice; pentru facilitarea administrării regimurilor terapeutice în doze dense
Filgrastimum	480 mcg/1.6 ml	sol. inj. in flacon		L03AA02	*În profilaxia primară a pacienților cu risc înalt de dezvoltare a neutropeniei febrile asociate terapiei mielotoxice; în profilaxia secundară a pacienților cu istoric de neutropenie dezvoltată ca urmare a terapiei mielotoxice; pentru facilitarea administrării regimurilor terapeutice în doze dense
Lenalidomidum	25 mg	capsule		L04AX04	*În tratamentul mielomei multiple
Nivolumabum	10 mg/ml	conc./sol. Perf.		L01XC17	*În tratamentul melanom metastatic. **În calitate de alternativă servește Pembrolizumabum.
Thalidomidum	50 mg	capsule		L04AX02	*În tratamentul mielomei multiple

8.2.4 Hormoni și antihormoni

Lista complementară

Abirateronum	250 mg	comprimate		L02BX03	*În tratamentul cancerului de prostată metastatic rezistent la castrare; □Alternativă terapeutică - Enzalutamidum
	500 mg	comprimate		L02BX03	*În tratamentul cancerului de prostată metastatic rezistent la castrare □Alternativă terapeutică - Enzalutamidum
Anastrozolum	1 mg	comprimate		L02BG03	*În tratamentul cancerului glandei mamare în stadiu incipient și cancerului glandei mamare metastatic □ Alternativă terapeutică - nivelul 4 al subgrupului chimic conform ATC (L02BG inhibitori de aromatază)
Bicalutamidum	50 mg	comprimate		L02BB03	*În tratamentul cancerului de prostată metastatic. □ Alternativă terapeutică - Flutamidum, Nilutamidum
	150 mg	comprimate		L02BB03	*În tratamentul cancerului de prostată metastatic. □ Alternativă terapeutică - Flutamidum, Nilutamidum
Dexamethasonum	4 mg/ml	sol. inj.		H02AB02	*În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, mielomei multiple, limfomei Burkitt
	2 mg/5 ml	pic. orale, soluție		H02AB02	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, mielomei multiple, limfomei Burkitt
	0.5 mg	comprimate		H02AB02	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, mielomei multiple, limfomei Burkitt
	2 mg	comprimate		H02AB02	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, mielomei multiple, limfomei Burkitt
	4 mg	comprimate		H02AB02	*În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, mielomei multiple, limfomei Burkitt

Hydrocortisonum	100 mg	pulb./sol. inj.		H02AB09	*În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, limfomei Burkitt
Leuprorelinum	3.75 mg	sol. inj.		L02AE02	*În tratamentul cancerului glandei mamare în faza incipientă și cancerului de prostată metastatic. □ Alternativă terapeutică - Goserelinum, Triptorelinum
	7.5 mg	sol. inj.		L02AE02	*În tratamentul cancerului glandei mamare în faza incipientă și cancerului de prostată metastatic. □ Alternativă terapeutică - Goserelinum, Triptorelinum
	22.5 mg	sol. inj.		L02AE02	*În tratamentul cancerului glandei mamare în faza incipientă și cancerului de prostată metastatic. □ Alternativă terapeutică - Goserelinum, Triptorelinum
Methylprednisolonum	40 mg/ml	susp. inj.		H02AB04	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, limfomei Burkitt
	40 mg	Pulb./susp. inj.		H02AB04	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, limfomei Burkitt
	80 mg/ml 1 ml	susp. inj.		H02AB04	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, limfomei Burkitt
	250 mg	pulb./sol.inj./perf.		H02AB04	
	500 mg	pulb./sol.inj./perf.		H02AB04	
	1 g	pulb./sol.inj./perf.		H02AB04	
	4 mg	comprimate		H02AB04	
	16 mg	comprimate		H02AB04	
	32 mg	comprimate		H02AB04	
Prednisolonum	5 mg/ml	sol. orală		H02AB06	[c] *În tratamentul Leucemiei limfocitare cronice, Diffuse large B-cell lymphoma, Hodgkin lymphoma, Follicular lymphoma, Acute lymphoblastic leukaemia, Burkitt lymphoma, Metastatic castration-resisant prostate cancer, Multiple myeloma. □ Alternativă terapeutică - Prednisonum
	30 mg/ml	susp. inj.		H02AB06	
	5 mg	comprimate		H02AB06	*În tratamentul Leucemiei limfocitare cronice, Diffuse large B-cell lymphoma, Hodgkin lymphoma, Follicular lymphoma, Acute lymphoblastic leukaemia, Burkitt lymphoma, Metastatic castration-resisant prostate cancer, Multiple myeloma. □ Alternativă terapeutică - Prednisonum

	25 mg	comprimate		H02AB06	*În tratamentul Leucemiei limfocitare cronice, Diffuse large B-cell lymphoma, Hodgkin lymphoma, Follicular lymphoma, Acute lymphoblastic leukaemia, Burkitt lymphoma, Metastatic castration-resisant prostate cancer, Multiple myeloma. □ Alternativă terapeutică - Prednisonum
Tamoxifenum	10 mg	comprimate		L02BA01	*În tratamentul cancerului glandei mamare în stadiu incipient și cancerului glandei mamare metastatic.
	20 mg	comprimate		L02BA01	*În tratamentul cancerului glandei mamare în stadiu incipient și cancerului glandei mamare metastatic.
Deflazacortum	30 mg	comprimate		H02AB13	
	22.75 mg/ml	Picături orale		H02AB13	

8.2.5 Medicamente de susținere

Lista complementară

Allopurinolum	100 mg	comprimate		M04AA01	[c] *În sindromul de liză tumorală.
	300 mg	comprimate		M04AA01	[c] *În sindromul de liză tumorală.
Mesnum	100 mg/ml	sol. inj.		V03AF01	*În tratamentul: Testicular germ cell tumour, Ovarian germ cell tumour, Osteosarcoma, Rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, limfomul Burkitt, Nefroblastomă (tumoare Wilms)
	400 mg	comprimate		V03AF01	*În tratamentul: Testicular germ cell tumour, Ovarian germ cell tumour, Osteosarcoma, Rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, limfomul Burkitt, Nefroblastomă (tumoare Wilms)
	600 mg	comprimate		V03AF01	*În tratamentul: Testicular germ cell tumour, Ovarian germ cell tumour, Osteosarcoma, Rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, limfomul Burkitt, Nefroblastomă (tumoare Wilms)
Acidum zoledronicum	4 mg/100 ml	sol. perf.		M05BA08	*În tratamentul bolilor maligne osoase.
	4 mg/5 ml	Conc./sol. perf.		M05BA08	*În tratamentul bolilor maligne osoase.
Acidum ibandronicum	6 mg/6 ml	sol. perf.		M05BA06	
	150 mg	comprimate		M05BA06	

9. Medicamente anti-parkinsoniene

Biperidenum	5 mg/ml	sol. inj.		N04AA02	□ Alternativă terapeutică - Trihexyphenidylum
	2 mg	comprimate		N04AA02	□ Alternativă terapeutică - Trihexyphenidylum
Levodopum+ □ Carbidopum	100 mg + 10 mg	comprimate		N04BA02	□ Alternativă terapeutică a Carbidopum - Benserazidum
	100 mg + 25 mg	comprimate		N04BA02	□ Alternativă terapeutică a Carbidopum - Benserazidum
	250 mg + 25 mg	comprimate		N04BA02	□ Alternativă terapeutică a Carbidopum - Benserazidum

Levodopum+ Benserazidum	200 mg + 50 mg	comprimate		N04BA02	
Bromocriptinum	2.5 mg	comprimate		N04BC01	
Trihexyphenidylum	2 mg	comprimate		N04AA01	
10. Medicamente care se utilizează în afecțiuni ale sângelui					
10.1 Medicamente antianemice					
Săruri de fier	echivalent cu 25 mg fier sulfat/ml*	sol. Orală		B03A	*Doză recomandată
	echivalent cu 60 mg fier*	comprimate		B03A	*Doză recomandată
Săruri de fier + Acidum folicum*	echivalent cu 60 mg fier + 400 mcg Acid folic**	comprimate		B03AD	*Supliment nutrițional în perioada gestației **Doza recomandată
Acidum folicum	400 mcg	comprimate		B03BB01	*Se administrează în pre-concepțională în scopul prevenirii defectelor de tub neural
	1 mg	comprimate		B03BB02	
	5 mg	comprimate		B03BB03	
Cyanocobalaminum	500 mcg/ml	sol. inj.		B03BA01	
Lista complementară					
Factori de stimulare a hematopoiezei*	1000IU/0.5 mL; 2000IU/0.5 mL; 3000IU/0.3 mL; 4000IU/0.4 mL; 5000IU/0.5 mL; 5000 IU/0.3 mL; 6000IU/0.6 mL; 8000IU/0.8mL; 10 000IU/1 mL; 20 000IU/0.5 mL; 40000IU/1 mL	sol. inj.		B03XA01	☐ Epoetin alfa, beta and theta, darbepoetin alfa, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta *inclusiv biosimilarele acestora
10.2 Medicamente care afectează coagularea					
Dabigatranum	110 mg	capsule		B01AE07	☐ Alternative terapeutice -Apixabanum, Edoxabanum și Rivaroxabanum.
	150 mg	capsule		B01AE07	☐ Alternative terapeutice -Apixabanum, Edoxabanum și Rivaroxabanum.
Enoxaparinum	2000 UI (20 mg)/0.2 ml; 4000 UI (40 mg)/0.4 ml; 6000 UI (60 mg)/0.6 ml; 8000 UI (80 mg)/0.8 ml; 10000 UI (100 mg)/1 ml; 12000 UI (120 mg)/0.8 ml	sol. inj.		B01AB05	☐ Alternative terapeutice - Nadroparinum, Dalteparinum. * Inclusiv biosimilarele evaluate din punct de vedere a calității
Bemiparinum	2500 UI/0.2 ml	sol. inj.		B01AB12	
	3500 UI/0.2 ml	sol. inj.		B01AB12	
Fondaparinuxum sodium	2.5 mg/0.5 ml	sol. inj.		B01AX05	
	7.5 mg/0.6 ml	sol. inj.		B01AX05	
Heparini natrium	20 000 IU/ml	sol. inj.		B01AB01	
	1000 IU/ml	sol. inj.		B01AB01	
	5000 IU/ml	sol. inj.		B01AB01	

Phytomenadionum	10 mg/ml	sol. inj.		B02BA01	
	1 mg/ml	sol. inj.		B02BA01	[c]
	10 mg	comprimate		B02BA01	
Protamini sulfas	10 mg/ml	sol. inj.		V03AB14	
Acidum tranexamicum	100 mg/ml	sol. inj.		B02AA02	
	500 mg	comprimate		B02AA02	
Aprotininum	100000 UI	Sol. Inj.		B02AB01	
Warfarinum	1 mg	comprimate		B01AA03	[c]
	2 mg	comprimate		B01AA03	[c]
	3 mg	comprimate		B01AA03	[c]
	5 mg	comprimate		B01AA03	[c]
Acenocoumarolum	2 mg	comprimate		B01AA07	
Lista complementară					
Desmopressinum	4 mcg/ml	sol. inj.		H01BA02	[c]
	5 mcg/doză; 10 mcg/doză	spray nazal		H01BA02	[c]
Heparini natrium	1000 IU/ml	sol. inj.		B01AB01	[c]
	5000 IU/ml	sol. inj.		B01AB01	[c]
Protamini sulfas	10 mg/ml	sol. inj.		V03AB14	[c]
Warfarinum	0.5 mg	comprimate		B01AA03	[c]
	1 mg	comprimate		B01AA03	[c]
	2 mg	comprimate		B01AA03	[c]
	5 mg	comprimate		B01AA03	[c]
	3 mg	comprimate		B01AA03	[c]
10.3 Alte medicamente pentru hemoglobinopatii					
Lista complementară					
Deferoxaminum	500 mg/flacon	pulb./sol. inj.		V03AC01	*Deferasirox sub formă orală poate servi ca alternativă
Hydroxycarbamidum	200 mg; 250 mg; 300 mg; 400 mg; 500 mg; 1000 mg	Forme orale solide		L01XX05	
11. Produse sanguine de origine umană și substituenți de plasmă					
11.1 Sânge și componente sanguine					
Plasmă proaspăt congelată					
Trombocite					
Eritrocite					
Sânge integral					
11.2 Medicamente derivate din plasmă					
Toate medicamentele derivate din plasmă umană trebuie să corespundă cerințelor OMS.					
11.2.1 Imunoglobuline umane					
Human anti-D immunoglobulinum	250 mcg/doza	sol.inj.		J06BB01	
Antitetanus imunoglobulinum	500 UI/flacon	sol. inj.		J06BB02	

Lista complementară					
Immunoglobulinum humanum	sol. proteica 16% (pu administrare i/m)	sol. inj.		J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară.
	sol. proteica 5% (pu administrare i/v)	sol. inj.		J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară și boala Kawasaki.
	sol. proteica 10% (pu administrare i/v)	sol. inj.		J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară și boala Kawasaki.
	sol. proteica 15% (pu administrare s/cutanat)	sol. inj.		J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară.
	sol. proteică 16% (pu administrare s/cutanat)	sol. inj.		J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară.
	50 mg/ml	sol. perf.		J06BA02	
	100 mg/ml	sol. perf.		J06BA02	
11.2.2 Factori de coagulare ai sângelui					
Factor VIII de coagulare	500 UI/flacon	pulb./sol. inj.		B02BD02	
	1000 UI/flacon	pulb./sol. inj.		B02BD02	
Factor IX de coagulare	500 UI/flacon	pulb./sol. inj.		B02BD04	
	1000 UI/flacon	pulb./sol. inj.		B02BD04	
Factor VIII de coagulare uman/Factor von Willebrand	500 UI+500 UI	Pulbere+solv/sol.inj.		B02BD06	
11.3 Substituenți de plasmă					
Dextranum 70	6%	sol. perf.		B05AA05	□Alternativă terapeutică - Polygelinum, Sol. Inj., 3,5%
Dextranum + Natrii chloridum	10%	sol. perf.		B05AA05	
12. Medicamente cardiovasculare					
12.1 Medicamente antianginoase					
Bisoprololum	1.25 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	2.5 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	5 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	10 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
Nitroglycerinum	500 mcg	comprimate sublinguale		C01DA02	
	5 mg/ml	sol. perf.		C01DA02	
	0.4 mg/1doza	Spray sublingual		C01DA02	
Isosorbidi dinitras	5 mg	comprimate sublinguale		C01DA08	
	20 mg	comprimate cu eliberare prelungita		C01DA08	
	40 mg	comprimate cu eliberare prelungita		C01DA08	
	40 mg	capsule cu eliberare prelungită		C01DA08	
	0.1% 10 ml	sol. perf.		C01DA08	

Isosorbidi mononitrat	20 mg	comprimate		C01DA14	
	40 mg	comprimate		C01DA14	
Sildenafilum	10 mg	comprimate		G04BE03	*În tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare de gradul 2 și 3
	20 mg	comprimate		G04BE03	*În tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare de gradul 2 și 3
	50 mg	Forme orale solide		G04BE03	*În tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare de gradul 2 și 3
Verapamilum	40 mg	comprimate		C08DA01	
	80 mg	comprimate		C08DA01	
	2.5 mg/ml	sol. inj.		C08DA01	
	5 mg/ml	sol. inj.		C08DA01	

12.2 Medicamente antiaritmice

Bisoprololum	1.25 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	2.5 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	5 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	10 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
Digoxinum	250 mcg/ml 2 ml	sol. inj.		C01AA05	
	50 mcg/ml	soluție orală		C01AA05	
	62,5 mcg	comprimate		C01AA05	
	250 mcg	comprimate		C01AA05	
Epinephrinum	100 mcg/ml	sol. inj.		C01CA24	
	0,18%	sol. inj.		C01CA24	
Lidocainum	20 mg/ml	sol. inj.		C01BB01	
Propafenonum	150 mg	comprimate		C01BC03	
	3.5 mg/ml	sol. inj.		C01BC03	
Verapamilum	40 mg	comprimate		C08DA01	
	80 mg	comprimate		C08DA01	
	2,5 mg/ml	sol. inj.		C08DA01	
	5 mg/ml	sol. inj.		C08DA01	

Lista complementară

Amiodaronum	50 mg/ml	sol. inj.		C01BD01	
	100 mg	Forme orale solide		C01BD01	
	200 mg	Forme orale solide		C01BD01	
	400 mg	Forme orale solide		C01BD01	

12.3 Medicamente antihipertensive

Amlodipinum	5 mg	Forme orale solide		C08CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de dihidropiridină C08CA
	10 mg	Forme orale solide		C08CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de dihidropiridină C08CA

Bisoprololum	1.25 mg	comprimate		C07AB07	☐ Atenolol, Metoprolol și Carvedilol servesc ca alternative. ** Atenolol nu se recomandă a fi administrat ca prima opțiune în cazul hipertensiunii necomplicate la persoane cu vârsta de peste 60 ani.
	2.5 mg	comprimate		C07AB07	☐ Atenolol, Metoprolol și Carvedilol servesc ca alternative. ** Atenolol nu se recomandă a fi administrat ca prima opțiune în cazul hipertensiunii necomplicate la persoane cu vârsta de peste 60 ani.
	5 mg	comprimate		C07AB07	☐ Atenolol, Metoprolol și Carvedilol servesc ca alternative. ** Atenolol nu se recomandă a fi administrat ca prima opțiune în cazul hipertensiunii necomplicate la persoane cu vârsta de peste 60 ani.
	10 mg	comprimate		C07AB07	☐ Atenolol, Metoprolol și Carvedilol servesc ca alternative. ** Atenolol nu se recomandă a fi administrat ca prima opțiune în cazul hipertensiunii necomplicate la persoane cu vârsta de peste 60 ani.
Bosentanum	32 mg	comprimate		C02KX01	* În tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare de gradul 2 și 3
	62.5 mg	comprimate		C02KX01	* În tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare de gradul 2 și 3
Enalaprilum	2,5 mg	comprimate		C09AA02	☐ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	5 mg	comprimate		C09AA02	☐ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	10 mg	Comprimate		C09AA02	☐ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	20 mg	Comprimate		C09AA02	☐ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	1.25 mg/1 ml	sol. Inj.		C09AA02	☐ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
Hidralazinum	20 mg	pulb./sol. inj.		C02DB02	Hidralazina se utilizează doar în tratamentul hipertensiunii severe în timpul sarcinii. Nu se recomandă administrarea Hidralazinei în tratamentul hipertensiunii esențiale datorită datelor privind eficacitatea și siguranța mai mare ale altor medicamente.
	25 mg	comprimate		C02DB02	hipertensiunii severe în timpul sarcinii. Nu se recomandă administrarea Hidralazinei în tratamentul hipertensiunii esențiale datorită datelor privind eficacitatea și siguranța mai mare ale altor medicamente.
	50 mg	comprimate		C02DB02	hipertensiunii severe în timpul sarcinii. Nu se recomandă administrarea Hidralazinei în tratamentul hipertensiunii esențiale datorită datelor privind eficacitatea și siguranța mai mare ale altor medicamente.

Hydrochlorothiazidum	50 mg/5 ml	sol. orală		C03AA03	☐ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	12.5 mg	Forme orale solide		C03AA03	☐ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	25 mg	Forme orale solide		C03AA03	☐ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	100 mg	Forme orale solide		C03AA03	☐ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
Enalaprilum + Hydrochlorothiazidum	10 mg + 12,5 mg	comprimate		C09BA02	
	10 mg + 25 mg	comprimate		C09BA02	
	20 mg + 12,5 mg	comprimate		C09BA02	
Lisinoprilum + Amlodipinum	5 mg+5 mg	comprimate		C09BB03	☐ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de dihidropiridină C08CA;
	10 mg+5 mg	comprimate		C09BB03	☐ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de dihidropiridină C08CA;
	20 mg+5 mg	comprimate		C09BB03	☐ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de dihidropiridină C08CA;
	20 mg+10 mg	comprimate		C09BB03	☐ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de dihidropiridină C08CA;
Lisinoprilum + Hydrochlorthiazidum	10 mg + 12,5 mg	comprimate		C09BA03	☐ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Hydrochlorthiazidum - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum;
	20 mg + 12,5 mg	comprimate		C09BA03	☐ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Hydrochlorthiazidum - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum;
	20 mg + 25 mg	comprimate		C09BA03	☐ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Hydrochlorthiazidum - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum;

Losartanum	25 mg	comprimate		C09CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - blocante ale receptorilor angiotensinei II (sartani) C09CA;
	50 mg	comprimate		C09CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - blocante ale receptorilor angiotensinei II (sartani) C09CA;
	100 mg	comprimate		C09CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - blocante ale receptorilor angiotensinei II (sartani) C09CA;
Losartanum + Hydrochlorthiazidum	50 mg+12.5 mg	comprimate		C09DA01	
Methyldopum	250 mg	comprimate		C02AB01	*Metildopa se utilizează doar în tratamentul hipertensiunii severe în timpul sarcinii. Nu se recomandă administrarea acesteia în tratamentul hipertensiunii esențiale datorită datelor privind eficacitatea și siguranța mai mare ale altor medicamente.
Nebivololum	5 mg	comprimate		C07AB12	
Telmisartanum + Amlodipinum	40 mg + 5 mg	comprimate		C09DB04	subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09CA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați ai dihidropiridină C08CA;
	80 mg + 5 mg	comprimate		C09DB04	□ Ca alternativă terapeutică a Telmisartanum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09CA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați ai dihidropiridină C08CA;
	80 mg + 10 mg	comprimate		C09DB04	□ Ca alternativă terapeutică a Telmisartanum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09CA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați ai dihidropiridină C08CA;
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	40 mg + 12.5 mg	comprimate		C09DA07	□ Ca alternativă terapeutică a Telmisartanum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09CA; Ca alternativă terapeutică a Hydrochlorthiazidum - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum;
	80 mg + 12.5 mg	comprimate		C09DA07	□ Ca alternativă terapeutică a Telmisartanum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09CA; Ca alternativă terapeutică a Hydrochlorthiazidum - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum;
	80 mg + 25 mg	comprimate		C09DA07	□ Ca alternativă terapeutică a Telmisartanum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09CA; Ca alternativă terapeutică a Hydrochlorthiazidum - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum;
Lista complementară					
Natrii nitroprussias	50 mg/fiolă	pulb./sol. perf.		C02DD01	
Norepinephrinum	0.1%	sol. inj.		C01CA03	*În șoc hipotensiv

12.4 Medicamente utilizate în insuficiența cardiacă

Bisoprololum	1.25 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	2.5 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	5 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	10 mg	comprimate		C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
Digoxinum	250 mcg/ml	sol. inj.		C01AA05	
	50 mcg/ml	soluție orală		C01AA05	
	62,5 mcg	comprimate		C01AA05	
	250 mcg	comprimate		C01AA05	
Dobutaminum	250 mg/20 ml	sol. perf.		C01CA07	
	250 mg/50 ml	sol. perf.		C01CA07	
Enalaprilum	2,5 mg	comprimate		C09AA02	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	5 mg	comprimate		C09AA02	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	10 mg	comprimate		C09AA02	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	20 mg	comprimate		C09AA02	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	1.25 mg/1 ml	sol. inj.		C09AA02	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
Furosemidum	10 mg/ml	sol. inj.		C03CA01	□ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	20 mg/5 ml	Forme orale lichide		C03CA01	[c] □ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	40 mg	comprimate		C03CA01	□ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
Hydrochlorothiazidum	12.5 mg	Forme orale solide		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	25 mg	Forme orale solide		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	100 mg	Forme orale solide		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
Losartanum	25 mg	comprimate		C09CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - blocante ale receptorilor angiotensinei II (sartani) C09CA;
	50 mg	comprimate		C09CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - blocante ale receptorilor angiotensinei II (sartani) C09CA;
	100 mg	comprimate		C09CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - blocante ale receptorilor angiotensinei II (sartani) C09CA;
Nebivololum	5 mg	comprimate		C07AB12	

Spironolactonum	25 mg	Forme orale solide		C03DA01	
	50 mg	Forme orale solide		C03DA01	
	100 mg	Forme orale solide		C03DA01	
Lista complementară					
Dopaminum	40 mg/ml	sol. inj.		C01CA04	
	5 mg/ml	sol. inj.		C01CA04	
12.5 Medicamente antitrombotice					
12.5.1 Medicamente antiplachetare (antiagregante)					
Acidum acetylsalicylicum	100 mg	Forme orale solide		N02BA01	
	75 mg	Forme orale solide		N02BA01	
	150 mg	Forme orale solide		N02BA01	
	300 mg	Forme orale solide		N02BA01	
Clopidogrelum	75 mg	Forme orale solide		B01AC04	
	300 mg	Forme orale solide		B01AC04	
12.5.2 Medicamente trombolitice					
Lista complementară					
Alteplasmum	10 mg	pulb./sol.inj.		B01AD02	
	20 mg	pulb./sol.inj.		B01AD02	
	50 mg	pulb./sol.inj.		B01AD02	
Streptokinasum	1,5 million UI	pulb./sol.inj.		B01AD01	
12.6 Agenți hipolipemianți					
Simvastatinum	5 mg	Forme orale solide		C10AA01	□ Alternativă terapeutică - Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin *Pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt
	10 mg	Forme orale solide		C10AA01	□ Alternativă terapeutică - Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin *Pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt
	20 mg	Forme orale solide		C10AA01	□ Alternativă terapeutică - Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin *Pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt
	40 mg	Forme orale solide		C10AA01	□ Alternativă terapeutică - Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin *Pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt
13. Medicamente dermatologice (topice)					
13.1 Medicamente antifungice					
Miconazolum	2%	unguent		D01AC02	nivel 4 - derivați de imidazol și triazol D01AC, cu excepția combinațiilor;
	2%	crema		D01AC02	nivel 4 - derivați de imidazol și triazol D01AC, cu excepția combinațiilor;
Seleniu sulfurat	2%	suspensie cutanată		D01AE13	
Natrii thiosulfas	15%	soluție de uz extern		V03AB06	
	2%	soluție uz extern		V03AB06	

Terbinafinum	1%	cremă		D01AE15	
	1%	unguent		D01AE15	
	1%	soluție uz extern		D01AE15	
	10 mg/ml	spray cutanat, soluție		D01AE15	
13.2 Medicamente antiinfecțioase					
Mupirocinum	2%	crema		D06AX09	
	2%	unguent		D06AX09	
Kalii permanganas	3 g	pulbere		D08AX06	*Pulbere pentru soluție uz extern
Sulfadiazini argenticum	1%	cremă		D06BA01	Copii> 2 luni
	1%	pastă cutanată		D06BA01	Copii> 2 luni
	1%	unguent		D06BA01	Copii> 2 luni
13.3 Medicamente antiinflamatoare și antipruriginoase					
Betamethasonum	0,1%	cremă		D07XC01	□ Alternativă terapeutică subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - corticosteroizi cu acțiune puternică (potență mare) D07AC (grupa III). https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D07AC&showdescription=no *La nou-născuți este preferabil Hydrocortisonum
	0,1%	unguent		D07AC01	□ Alternativă terapeutică subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - corticosteroizi cu acțiune puternică (potență mare) D07AC (grupa III). https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D07AC&showdescription=no
Betamethasonum + Acidum salicylicum	0.5 mg+20 mg/g 30 ml	soluție cutanată		D07XC01	
	0.5 mg+30 mg/1 g (0,64 mg + 30 mg/g)	unguent		D07XC01	
Betamethasonum+ Clotrimazolum+ Gentamicinum	0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15	unguent		D07CC01	
	0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g	crema		D07CC01	
Betamethasonum+ Gentamicinum	0.5 mg + 1 mg/g	crema		D07CC01	
Calaminum	Doza nu este specificată	loțiune			
Hydrocortisonum	1%	crema		D07AA02	nivel 4 - corticosteroizi cu acțiune mai slabă potență mică (grupa I) D07AA. https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D07AA&showdescription=no
	1%	unguent		D07AA02	□ Alternativă terapeutică subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - corticosteroizi cu acțiune mai slabă potență mică (grupa I) D07AA. https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D07AA&showdescription=no
13.4 Medicamente care afectează diferențierea și proliferarea pielii					
Benzoyl peroxidum	5%	loțiune, cremă		D10AE01	
Gudron de cărbune (coal tar)	5%	soluție uz extern		D05AA	
Calcipotriol	50 mcg/ml	cremă, unguent		D05AX02	□ Alternativă terapeutică - Calcitriol, Tacalcitol
	50 mcg/ml	loțiune		D05AX02	□ Alternativă terapeutică - Calcitriol, Tacalcitol
Fluorouracilum	5%	unguent		L01BC02	
Podophyllum resin	10% - 25%	soluție uz extern		D06BB04	□ Alternativă terapeutică -Podophyllotoxin
Acidum salicylicum	5%	soluție uz extern		D02AF	
	1%	soluție cutanată		D01AE12	
Solcoserylum	4,15 mg/g 20 g	gel		D03AX	
Urea	10%	cremă, unguent		D01AE	
	5%	cremă, unguent		D01AE	
Zinci oxydum	10%	unguent, cremă, pastă		D02AB	
	25%	pastă		D02AB	
13.5 Scabicidele și pediculicidele					
Benzylil benzoas	25%	loțiune		P03AX01	□ Alternativă terapeutică - unguent topic cu sulf precipitat * Copii> 2 ani
	20%	emulsie cutanată		P03AX01	□ Alternativă terapeutică - unguent topic cu sulf precipitat * Copii> 2 ani
	20%	cremă, unguent		P03AX01	□ Alternativă terapeutică - unguent topic cu sulf precipitat * Copii> 2 ani
	10%	Crema, unguent		P03AX01	□ Alternativă terapeutică - unguent topic cu sulf precipitat * Copii> 2 ani
Permethrinum	5%	cremă		P03AC04	
	1%	loțiune		P03AC04	
	0,50%	soluție cutanată		P03AC04	

14. Remedii de diagnosticare**14.1 Medicamente oftalmice**

Fluoresceinum	1%	picături oftalmice, soluție		S01JA01	
	0.1%	picături oftalmice		S01JA01	
	10%	soluție injectabilă		S01JA01	
Tropicamidum	0,5%	picături oftalmice, soluție		S01FA06	☐ Alternativă terapeutică - Atropin, Cyclopentolat
	1%	picături oftalmice, soluție		S01FA06	☐ Alternativă terapeutică - Atropin, Cyclopentolat

14.2 Medii de radiocontrast

Amidotrizoatum	140 mg până la 420 mg	sol. inj.		V08AA01	
Barii sulfas	doza nu e indicată	pulbere pentru soluție orală		V08BA02	
Iohexolum	140 mg până la 350 mg Iod/ml	sol. inj.		V08AB02	
Iopamidolum	755,3 mg/ml	sol. inj.		V08AB04	
Iopromidum	768,86 mg/ml	sol. inj.		V08AB05	
	623,40 mg/ml	sol. inj.		V08AB05	
Acidum diatrizoicum	76%	sol. inj.		V08AA01	
Lipiodol Ultra Fluid	480 mg iod/ml	sol. inj.		V08AD01	
Acidum gadobenicum	529 mg/ml	sol. inj.		V08CA08	

Lista complementară

Barii sulfas	doza nu e indicată	suspensie apoasă		V08BA02	[c]
Megluminum iotroxat	5 până la 8 g iiod (sub formă de meglumină)	sol. inj.		V08AC02	

15. Dezinfectanți și antiseptice**15.1 Antiseptice**

Chlorhexidinum	5,00%	soluție pu uz extern		D08AC02	
	0.05%	soluție pu uz extern		D08AC02	
Spiritus aethylicus	70%	soluție		D08AX08	☐ Alternativă terapeutică - Propanol
Povidoni iodinum	10% (echivalent cu 1% Iod)	soluție cutanată		D08AG02	☐ Alternativă terapeutică - Iodin
Viridum nitens	1%	soluție uz extern		D08AX	

Listă complementară

Povidoni iodidum	10%	unguent		D08AG02	
	200 mg	ovule		G01AX11	

15.2 Dezinfectanți

Soluții alcoolice pentru dezinfectarea mâinilor	80% etanol (alcool etilic)	soluție de uz extern			
	75% izopropanol (alcool izopropilic)	soluție de uz extern			
Spiritus aethylicus	96%	Soluție		D08AX08	
Compuși ai clorului	0,1% clor activ	lichid, pulbere, forme solide - pentru soluție de uz extern		D08AX	
Chloroxylenolum	4,80%	soluție uz extern		D08AE05	☐ Alternativă terapeutică subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - fenol și derivații Cod ATC D08AE.
Glutaral	2%	soluție uz extern		D08AX09	

16. Diuretice

Amiloridum	5 mg	comprimate		C03DB01	
Furosemidum	10 mg/ml	sol. inj.		C03CA01	☐ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	20 mg/5 ml	forme orale lichide		C03CA01	[c] ☐ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	40 mg	comprimate		C03CA01	☐ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	10 mg	comprimate		C03CA01	[c] ☐ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	20 mg	comprimate		C03CA01	[c] ☐ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum

Hydrochlorothiazidum	50 mg/5 ml	sol. orală		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	12.5 mg	Forme orale solide		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	25 mg	Forme orale solide		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	100 mg	Forme orale solide		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
Mannitolum	10%	sol. perf.		B05BC01	
	20%	sol. perf.		B05BC01	
Spironolactonum	25 mg	Forme orale solide		C03DA01	
Spironolactonum	50 mg	Forme orale solide		C03DA01	
Spironolactonum	100 mg	Forme orale solide		C03DA01	

Lista complementară

Hydrochlorothiazidum	25 mg	Forme orale solide		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazid, Chlortalidon [c]
Hydrochlorothiazidum	100 mg	Forme orale solide		C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazid, Chlortalidon [c]
Mannitolum	10%	sol. perf.		B05BC01	[c]
	20%	sol. perf.		B05BC01	[c]
Spironolactonum	5 mg/5 ml	sol. orală		C03DA01	[c]
	10 mg/5 ml	sol. orală		C03DA01	[c]
	25 mg/5 ml	sol. orală		C03DA01	[c]
	25 mg	Forme orale solide		C03DA01	[c]
	50 mg	Forme orale solide		C03DA01	[c]
	100 mg	Forme orale solide		C03DA01	[c]

17. Medicamente gastrointestinale

Lista complementară

Enzime pancreatice				A09AA02	*Forme farmaceutice și doze corespunzătoare vârstei, incluzând lipaza, proteaza și amilaza.
Acidum ursodeoxycholicum	150 mg	Forme orale solide		A05AA02	
	250 mg	Forme orale solide		A05AA02	
	300 mg	Forme orale solide		A05AA02	
	500 mg	Forme orale solide		A05AA02	
	250 mg/5 ml	susp. orală		A05AA02	* Copii
Simethiconum	40 mg/ml	picături orale, emulsie		A03AX13	* Alternativă terapeutică - Dimethiconum
	100 mg/ml	picături orale, emulsie		A03AX13	* Alternativă terapeutică - Dimethiconum
	40 mg	Forme orale solide		A03AX13	* Alternativă terapeutică - Dimethiconum
	80 mg	Forme orale solide		A03AX13	* Alternativă terapeutică - Dimethiconum
	120 mg	Forme orale solide		A03AX13	* Alternativă terapeutică - Dimethiconum
Domperidonum	10 mg	Forme orale solide		A03FA03	

17.1 Medicamente antiulceroase					
Omeprazolum	20 mg	pulb./sol. orală		A02BC01	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (inhibitori ai pompei de protoni grup ATC A02BC) excluzând combinațiile
	40 mg	pulb./sol. orală		A02BC01	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (inhibitori ai pompei de protoni grup ATC A02BC) excluzând combinațiile
	40 mg	pulb. /sol. Inj.		A02BC01	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (inhibitori ai pompei de protoni grup ATC A02BC) excluzând combinațiile
	10 mg	Forme orale solide		A02BC01	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (inhibitori ai pompei de protoni grup ATC A02BC) excluzând combinațiile
	20 mg	Forme orale solide		A02BC01	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (inhibitori ai pompei de protoni grup ATC A02BC) excluzând combinațiile
	40 mg	Forme orale solide		A02BC01	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (inhibitori ai pompei de protoni grup ATC A02BC) excluzând combinațiile
Famotidinum	10 mg	Forme orale solide		A02BA03	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (antagoniști ai receptorilor H2 grup ATC A02BA) excluzând combinațiile
	20 mg	Forme orale solide		A02BA03	- Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (antagoniști ai receptorilor H2 grup ATC A02BA) excluzând
	40 mg	Forme orale solide		A02BA03	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (antagoniști ai receptorilor H2 grup ATC A02BA) excluzând combinațiile
17.2 Medicamente antiemetice					
Dexamethasonum	4 mg/ml 1 ml	sol. inj.		H02AB02	
	0,5 mg/5 ml	pic. orale, soluție		H02AB02	
	2 mg/5 ml	pic. orale, soluție		H02AB02	
	0,5 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		H02AB02	
	0,75 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		H02AB02	
	1,5 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		H02AB02	
	4 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		H02AB02	
Metoclopramidum	5 mg/ml	sol. inj.		A03FA01	*Interzis la nou-născuți
	5 mg/5 ml	soluție orală		A03FA01	[c] *Interzis la nou-născuți
	10 mg	comprimate		A03FA01	*Interzis la nou-născuți
	1 mg/5 ml	sirop		A03FA01	*Interzis la nou-născuți

Ondansetronum	2 mg/ml	sol. inj.		A04AA01	Palonosetron - tropisetron * Copii> 1 lună
	4 mg /5ml	sol. orală		A04AA01	☐ Alternativă terapeutică - Dolasetron, Granisetron, Palonosetron - tropisetron
	4 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		A04AA01	Palonosetron - tropisetron * Copii> 1 lună
	8 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		A04AA01	Palonosetron - tropisetron * Copii> 1 lună
	24 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		A04AA01	Palonosetron - tropisetron * Copii> 1 lună

Lista complementară

Aprepitantum	80 mg	capsule		A04AD12	
	125 mg	capsule		A04AD12	
	165 mg	capsule		A04AD12	
	125 mg	pulb./susp. orală		A04AD12	

17.3 Medicamente antiinflamatoare

Sulfasalazinum	500 mg	forme orale solide		A07EC01	* Clismă de retenție (retention enema) ☐ Alternativă terapeutică - Mesalazinum
	500 mg	supozitoare		A07EC01	* Clismă de retenție (retention enema) ☐ Alternativă terapeutică - Mesalazinum
	500 mg	comp. gastrorez.		A07EC01	
Budesonidum	3 mg	forme orale solide		A07EA06	
	9 mg	forme orale solide		A07EA06	

Lista complementară

Hydrocortisonum	25 mg	supozitoare		A07EA02	* Clismă de retenție
Prednisolonum	30 mg/ml	sol. Inj.		A07EA01	
	5 mg	comprimate		A07EA01	
Methylprednisolonum	4 mg	comprimate		H02AB04	

17.4 Laxative

Senna	7,5 mg senozide	Forme orale solide		A06AB06	☐ Alternativă terapeutică - Bisacodil
	70 mg	Forme orale solide		A06AB06	☐ Alternativă terapeutică - Bisacodil

17.5 Medicamente utilizate în diaree

Săruri pentru rehidratare orală - zinc sulfat	A se vedea compartiment 17.5	pulbere pentru soluție orală			Co-pachet care conține: SRO pulbere pentru soluție orală de la pct. 17.5.1 - cu Zinc sulfat formă orală solidă 20 mg de la pct. 17.5.2
--	------------------------------	------------------------------	--	--	--

17.5.1 Rehidratare orală					
Saruri pentru rehidratare orală	Glucosum: 75 mEq Sodium: 75 mEq or mmol/L Chloridum: 65 mEq or mmol/L Potassium: 20 mEq or mmol/L Citratum: 10 mmol/L Osmolaritatea: 245 mOsm/L Glucosum: 13.5 g/L Sodium chloridum: 2.6 g/L Potassium chloridum: 1.5 g/L Trisodium citratum dihidrat*: 2.9 g/L	pulbere pentru soluție orală		A07CA	* Dihidratul de trisodiu citrat poate fi înlocuit cu bicarbonat de sodiu (hidrogeno- carbonat de sodiu) 2.5 g/l. Cu toate acestea, având în vedere că stabilitatea celui din urmă este foarte mică în condiții tropice, se recomandă doar în cazul preparării imediate.
17.5.2 Medicamente în tratamentul diareei					
Zincum sulfas	20 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata		A12CB01	*În caz de diaree acută, sulfatul de zinc se folosește ca tratament adjuvant terapiei de rehidratare salină orală.
Nifuroxazidum	100 mg	capsule, comprimate		A07AX03	
	200 mg	capsule		A07AX03	
	200 până la 220 mg/5 ml	suspensie orală		A07AX03	
Loperamidum	2 mg	Forme orale solide		A07DA03	
18. Medicamente pentru tulburări endocrine					
<i>Lista complementară</i>					
Gonadotrophinum chorionicum	250 mcg (6500 UI)	sol. inj.		G03GA08	
Octreotidum	0.1 mg/1 ml	soluție inj.		H01CB02	
Somatropinum		pulbere/sol.inj.		H01AC01	
18.1 Hormoni suprarenalieni și analogi sintetici					
Fludrocortisonum	100 mcg	comprimate		H02AA02	
Hydrocortisonum	5 mg	comprimate		H02AB09	
	10 mg	comprimate		H02AB09	
	20 mg	comprimate		H02AB09	
	100 mg/2 ml	Pulb.+solv./sol. inj.		H02AB09	
	25 mg/5 ml	susp. inj.		H02AB09	
Cyproheptadinum	4 mg	comprimate		R06AX02	
18.2 Androgeni					
<i>Lista complementară</i>					
Testosteronum	100 mg/ml	sol. inj.		G03BA03	
Testosteronum	200 mg/ml	sol. inj.		G03BA03	
Testosteronum	250 mg/ml	sol. inj.		G03BA03	

18.3 Estrogeni (LME OMS nu specifica niciun medicamente în această categorie)

18.4 Progestogeni

Medroxyprogesteronum	5 mg	comprimate		G03DA02	☐ Alternativă terapeutică -Noretisteron
Medroxyprogesteronum	150 mg/ml	susp. inj.		G03DA02	

18.5 Medicamente pentru diabet

18.5.1 Insuline

Insulinum humanum (solubilă) (cu acțiune rapidă)	40 UI/ml	sol. inj.		A10AB01	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
	100 UI/ml	sol. inj.		A10AB01	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum humanum (cu acțiune intermediară)	40 UI/ml	sol. inj.		A10AC01	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
	100 UI/ml	susp. inj.		A10AC01	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum humanum (act.interm.deb.rap)	100 UI/ml	susp. inj.		A10AD01	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum aspartum	100 UI/ml	sol. inj.		A10AB05	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum aspartum biphasic	100 UI/ml	susp. inj.		A10AD05	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum degludecum	100 UI/ml	sol. inj.		A10AE06	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum detemirum	100 UI/ml	sol. inj.		A10AE05	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum glarginum	100 UI/ml	sol. inj.		A10AE04	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
	300 UI/ml	sol. inj.		A10AE04	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum glulisinum	100 UI/ml	sol. inj.		A10AB06	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
Insulinum lispro	100 UI/ml	sol. inj.		A10AB04	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată

18.5.2 Agenți hipoglicemici orali

Empagliflozinum	10 mg	comprimate		A10BK03	☐ Alternativă terapeutică - Canagliflozinum, Dapagliflozinum
	25 mg	comprimate		A10BK03	☐ Alternativă terapeutică - Canagliflozinum, Dapagliflozinum
Gliclazidum	30 mg	comprimate cu elib. modificată		A10BB09	☐ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Sulfonilureice - cod ATC A10BB https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=A10BB&s-howdescription=no * Glibenclamidum este contraindicată persoanelor cu vîrsta peste 60 ani.
	60 mg	comprimate cu elib. modificată		A10BB09	☐ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Sulfonilureice - cod ATC A10BB https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=A10BB&s-howdescription=no * Glibenclamidum este contraindicată persoanelor cu vîrsta peste 60 ani.
	80 mg	comprimate cu elib. modificată		A10BB09	☐ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Sulfonilureice - cod ATC A10BB https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=A10BB&s-howdescription=no * Glibenclamidum este contraindicată persoanelor cu vîrsta peste 60 ani.

Metforminum	500 mg	Forme orale solide		A10BA02	
	850 mg	Forme orale solide		A10BA02	
	1000 mg	Forme orale solide		A10BA02	

Lista complementară

Metforminum	500 mg	Forme orale solide		A10BA02	[c]
	850 mg	Forme orale solide		A10BA02	[c]
	1000 mg	Forme orale solide		A10BA02	[c]
Repaglinidum	0.5 mg	comprimate		A10BX02	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte hipoglicemizante, cu excepția insulinelor - cod ATC A10BX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A10BX&s=1
	1 mg	comprimate		A10BX02	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte hipoglicemizante, cu excepția insulinelor - cod ATC A10BX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A10BX&s=1
	2 mg	comprimate		A10BX02	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte hipoglicemizante, cu excepția insulinelor - cod ATC A10BX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A10BX&s=1
Vildagliptinum	50 mg	comprimate		A10BH02	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Inhibitori ai Dipeptidil peptidazei 4 (DPP-4) - cod ATC A10BH https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A10BH&s=1
Liraglutidum	6 mg/ml	sol. inj.		A10BJ02	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Analogi ai GLP-1 - cod ATC A10BJ

18.6 Medicamente în hipoglicemie

Glucagonum	1 mg/ml	sol. inj.		H04AA01	
------------	---------	-----------	--	---------	--

Lista complementară

Diazoxide	50 mg/ml	Picături orale, soluție		V03AH01	[c]
Diazoxide	50 mg	comprimate		V03AH01	[c]

18.7 Hormoni tiroidieni și medicamente antitiroidiene

Levothyroxinum	25 mcg	comprimate		H03AA01	[c]
	50 mcg	comprimate		H03AA01	
	75 mcg	comprimate		H03AA01	
	100 mcg	comprimate		H03AA01	
	150 mcg	comprimate		H03AA01	
Kalii iodidum	60 mg	comprimate		V03AB21	
Methimazolum	5 mg	comprimate		H03BB02	□ Alternativă terapeutică - Carbimazolum
	10 mg	comprimate		H03BB02	□ Alternativă terapeutică - Carbimazolum
	20 mg	comprimate		H03BB02	□ Alternativă terapeutică - Carbimazolum
Propylthiouracilum	50 mg	comprimate		H03BA02	*Se administrează când tratamentul alternativ de prima linie nu este disponibil sau este contraindicat; se administrează la gravide în primul trimestru de sarcină

Lista complementară

Soluție Lugol	130 mg total iod/ml 1g+2g+94g/100ml	Forme orale lichide Soluție bucofaringiană		R05CA02	[c]
Methimazolum	5 mg	comprimate		R05CA02	* Iodum + Kalii iodidum + Glycerolum
Methimazolum	10 mg	comprimate		H03BB02	[c] □ Alternativă terapeutică - Carbimazolum
Methimazolum	20 mg	comprimate		H03BB02	[c] □ Alternativă terapeutică - Carbimazolum
Kalii iodidum	60 mg	comprimate		V03A	[c]
	100 mcg	comprimate		H03CA	
	200 mcg	comprimate		H03CA	
Propylthiouracilum*	50 mg	comprimate		H03BA02	[c] *Se administrează când tratamentul alternativ de prima linie nu este disponibil sau este contraindicat;
Thiamazolum	5 mg	comprimate		H03BB02	
	10 mg	Comprimate		H03BB02	
Methylprednisolonum	500 mg	Pulb./sol. inj./perf.		H02AB04	
Cabergolinum	0,5 mg	comprimate		G02CB03	

19. Medicamente imunologice

19.1 Agenți de diagnosticare

Tuberculinum PPD (derivat proteic purificat)	2 UT/doza 1-10 doze	sol. inj.		V04CF01	*Toate tuberculinele trebuie să corespundă cerințelor OMS.
--	---------------------	-----------	--	---------	--

19.2 Seruri și imunoglobuline

Anticorpi monoclonali împotriva virusului rabic	40 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	* inclusiv medicamente biosimilare cu calitate asigurată
	100 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	* inclusiv medicamente biosimilare cu calitate asigurată
	300 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	* inclusiv medicamente biosimilare cu calitate asigurată
	600 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	* inclusiv medicamente biosimilare cu calitate asigurată
Immunoglobulinum humanum antirabicum	100 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	
Immunoglobulinum antirabicum din ser ecvin	150 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	
	200 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	
	300 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	
	400 UI/ml	sol. inj.		J06BB05	
Immunoglobulinum humanum antihepaticum	1560 UI/5 ml	sol. inj./perf.		J06BB04	
	2000 UI	sol. inj./perf.		J06BB04	
Imunoglobulină antivenin		sol. inj.		J06AA03	*Tipul exact se determină la nivel local. Toate fracțiile plasmatice trebuie să corespundă cerințelor OMS.
Antitoxin difteric	10 000 IU (per flacon)	sol. inj.		J06AA01	cerințelor OMS.
	20 000 IU (per flacon)	sol. inj.		J06AA01	cerințelor OMS.
Serum antitbotulinicum Tip A	10000 UI/doza	sol. inj.		J06AA04	
Serum antitbotulinicum Tip B	5000 UI/doza	sol. inj.		J06AA04	
Serum antitbotulinicum Tip E	10000 UI/doza	sol. inj.		J06AA04	
Serum anticarbunicum	10 ml	sol. inj.		J06BC	
Serum antitetanicum	3000 UI/doza	sol. inj.		J06AA02	

19.3 Vaccinuri (a vedea HG nr. 1113/2016 cu privire la aprobarea Programului național de imunizări pentru anii 2016-2020)

Recomandate pentru toți

Vaccin BCG					
Vaccin difteric					

Vaccin Haemophilus influenzae tip b (Hib)					
Vaccin hepatic B					
Vaccin papilomavirus uman (HPV)					
Vaccin rujeola					
Vaccin pertusis					
Vaccin pneumococic					
Vaccin poliomieltic					
Vaccin poliomieltic bivalent de tip 1 și 3 (viu atenuat)					
Vaccin rotavirus					
Vaccin rotavirus, viu, pentavalentă					
Vaccin rubeolic					
Vaccin antitetanus					
Vaccin difteric și tetanic adsorbit					
Vaccin difteric și tetanic adsorbit pediatric(DT)					
Vaccin difteric și tetanic adsorbit(Td)					
Vaccin difteric, tetanic, pertussis (component acelular) - DTPa					
Vaccin rujeolic, oreionic, rubeolic, viu atenuat					
Recomandate doar pentru anumite regiuni					
Vaccin împotriva encefalitei transmise de căpușe					
Recomandate pentru anumite grupuri de populație aflate sub risc					
Vaccin împotriva hepatitei virale A					
Vaccin hepatic A					
Vaccin hepatic C					
Vaccin împotriva meningitei meningococice					
Vaccin meningococic					
Vaccin antirabicum					
Recomandate pentru Programe de Imunizări cu anumite caracteristici					
Vaccin antigripal (sezonier)					
Vaccin Oreion (Parotidită epidemică)					
Vaccin împotriva Varicelei					
20 Relaxante musculare (cu acțiune periferică) și inhibitori ai colinesterazei					
Atracurium	10 mg/ml	sol. inj.		M03AC04	
Neostigminum	500 mcg/ml	sol. inj./sol. perf.		N07AA01	
	2,5 mg/ml	sol. inj./sol. perf.		N07AA01	
	15 mg	comprimate		N07AA01	
Suxamethonium	50 mg/ml	sol. inj./sol. perf.		M03AB01	
	20 mg/ml	sol. inj.		M03AB01	
Vecuronium	10 mg/flacon)	pulb./sol. inj.		M03AC03	□ [c]
Lista complementară					
Pyridostigminum	1 mg/ml	sol. inj./sol. perf.		N07AA02	
	60 mg	comprimate		N07AA02	
Vecuronium	10 mg/flacon	pulb./sol. inj.		M03AC03	
Ipidacrinum	5 mg/ml	sol. inj.		N06DA05	
	15 mg/ml	sol. inj.		N06DA05	
	20 mg	comprimate		N06DA05	
Tizanidinum	2 mg	comprimate		M03BX02	
	4 mg	comprimate		M03BX02	
Tolperisonum	50 mg	comprimate		M03BX04	
	150 mg	comprimate		M03BX04	
21 Preparate oftalmologice					
21.1 Agenți antiinfecțioși					
Aciclovirum	3%	unguent oftalmic		S01AD03	
Azithromycinum	1.5%	picături oftalmice, soluție		S01AA26	* în Trachoma

Erythromycinum	0.5%	unguent oftalmic		S01AA17	[c] *În infecții cauzate de Chlamydia trachomatis sau Neisseria gonorrhoea
Gentamicinum	0,3%	picături oftalmice, soluție		S03AA06	□ Alternativă terapeutică - Amikacinum, Kanamycinum, Methilmecinum, Tobramycinum * În tratamentul blefaritei bacteriene și conjunctivitei
Natamycinum	5%	picături oftalmice,		S01AA10	* În tratamentul keratitei fungice
Ofloxacinum	0,3%	picături oftalmice, soluție		S01AE01	ATC de nivelul 4 - Fluorochinolone - cod ATC S01AE https://www.whooc.no/atc_ddd_index/ *În tratamentul keratitei bacteriene și conjunctivite bacteriene
Tetracyclinum	1%	unguent oftalmic		S01AA09	Oxytetracyclinum * În tratamentul blefaritei bacteriene, conjunctivitei bacteriene, keratitei bacteriene și trachom

Lista complementară

Fluconazolum	0.3% 5 ml	picături oftalmice		S01AA	
Chloramphenicolum	0,25%	picături oftalmice		S02AA01	
Ciprofloxacinum+ Dexamethasonum	3 mg+1 mg/ml	picături oftalmice, suspensie		S03CA01	
Dexamethasonum+	1 mg+3500 UI+6000 UI/ml	picături oftalmice		S03CA01	
Neomycinum+ Polymyxinum B	1 mg+3500 UI+6000 UI/ml	unguent oftalmic		S03CA01	
Dexamethasonum+ Tobramycinum	1 mg + 3 mg/ml	picături oftalmice		S03CA01	
Ganciclovirum	0,15%	gel oftalmic		S01AD09	
Sulfacetamidum	20%	picături oftalmice		S01AB04	
	30%	picături oftalmice		S01AB04	

21.2 Agenți antiinflamatori

Prednisolonum	0,5%	picături oftalmice, soluție		S01BA04	
Dexamethasonum	1 mg/ml	picături oftalmice		S01BA01	
	1 mg/ml	unguent oftalmic		S01BA01	
Diclofenacum	1 mg/ml	picături oftalmice		S01BC03	

Hydrocortisonum	0,5%	picaturi oftalmice		S01BA02	
	1%	picaturi oftalmice		S01BA02	
	0,5%	unguent oftalmic		S01BA02	
	1%	unguent oftalmic		S01BA02	
Natrii chloridum	50 mg/ml	picaturi oftalmice/nazale		S01XA03	

21.3 Anestezice locale

Tetracainum	0,5%	picaturi oftalmice, solutie		S01HA03	☐ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Anestezice locale, cu excepția Cocainei și combinațiilor - cod S01HA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01HA&s howdescription=no *Interzis la copii născuți prematur
	1%	picaturi oftalmice, solutie		S01HA03	☐ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Anestezice locale, cu excepția Cocainei și combinațiilor - cod S01HA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01HA&s howdescription=no *Interzis la copii născuți prematur

21.4 Miotice și medicamente antiglaucom

Acetazolamidum	250 mg	comprimate		S01EC01	☐ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Inhibitori ai anhidrazei carbonice - cod S01EC https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01EC&s howdescription=no
Latanoprostum	0,05 mg/ml	picaturi oftalmice, solutie		S01EE01	☐ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Analogi de prostaglandine - cod S01EE https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01EE&s howdescription=no
Pilocarpinum	1%	picaturi oftalmice, solutie		S01EB01	☐ Alternativă terapeutică - Carbacholum
	2%	picaturi oftalmice, solutie		S01EB01	
	4%	picaturi oftalmice, solutie		S01EB01	
Timololum	0,25%	picaturi oftalmice, solutie		S01ED01	ATC de nivelul 4 - Agenți betablocanți, cu excepția combinațiilor - cod S01ED https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01ED&s howdescription=no
	0,5%	picaturi oftalmice, solutie		S01ED01	☐ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Agenți betablocanți, cu excepția combinațiilor - cod S01ED https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01ED&s howdescription=no
Travoprostum + Timololum	40 mcg + 5 mg/ml	picaturi oftalmice, solutie		S01ED51	
Brimonidinum+Timololum	2 mg+ 5 mg/ml	picaturi oftalmice, solutie		S01ED51	

21.5 Midriatice

Atropinum	0.1%	picaturi oftalmice, solutie		S01FA01	*Copii>3 luni ☐ Alternativă terapeutică - Cyclopentolatum hydrochloridum, Homatropinum hydrobromidum
	0.5%	picaturi oftalmice, solutie		S01FA01	*Copii>3 luni ☐ Alternativă terapeutică - Cyclopentolatum hydrochloridum, Homatropinum hydrobromidum
	1%	picaturi oftalmice, solutie		S01FA01	*Copii>3 luni ☐ Alternativă terapeutică - Cyclopentolatum hydrochloridum, Homatropinum hydrobromidum

Tropicamidum	0,5%	picături oftalmice, soluție		S01FA06	□ Alternativă terapeutică - Atropin, Cyclopentolat
	1%	picături oftalmice, soluție		S01FA06	□ Alternativă terapeutică - Atropin, Cyclopentolat
Lista complementară					
Epinephrinum	2%	Picături oftalmice, soluție		S01EA01	
21.6 Factorul de creștere endotelial anti-vascular (VEGF)					
Lista complementară					
Bevacizumabum	25 mg/ml	Conc./sol. inj./perf.		L01XC07	* inclusiv medicamente biosimilare cu calitate asigurată
22 Medicamente pentru sănătatea reproducerii și îngrijirea perinatală					
22.1 Contraceptive					
22.1.1 Contraceptive hormonale orale					
Ethinylestradiolum+ Levonorgestrelum	30 mcg +150 mcg	Forme orale solide		G03AA07	
	30 mcg + 50 mcg	comprimate		G03AA07	
Ethinylestradiol + norethisterone	35 mcg + 1 mg	comprimate		G03AA05	
Levonorgestrelum	30 mcg	comprimate		G03AC03	
	750 mcg	comprimate		G03AC03	
	1,5 mg	comprimate		G03AC03	
Ulipristalum	30 mg	comprimate		G03AD02	
Ethinylestradiolum	10 mcg	comprimate		G03CA01	
	50 mcg	comprimate		G03CA01	
Ethinylestradiolum+ Gestodenum	0.02 mg+0.075 mg	drajeuri		G03AA10	
Ethinylestradiolum+ Gestodenum	0.02 mg+0.075 mg	comprimate		G03AA10	
Desogestrelum	0.075 mg	comprimate		G03AC09	
Desogestrelum+ Ethinylestradiolum	0.15 mg+ 0.03 mg	comprimate		G03AA09	
Drospirenonum+ Ethinylestradiolum	3 mg+0.03 mg	comprimate		G03AA12	
22.1.2 Contraceptive hormonale injectabile					
Estradiolum cypionat + Medroxyprogesteronum acetat	5 mg+ 25 mg	sol. inj.		G03FA12	
Medroxyprogesteronum	104 mg/0.65 ml	sol. inj. (s/cutanat)		G03DA02	
	150 mg/ml	Susp. inj. (i/m)		G03AC06	
Norethisteronum	200 mg/ml	sol. inj. Uleioasa		G03AC01	
22.1.3 Dispozitive intrauterine					
Dispozitive intrauterine cu conținut de cupru				G02BA02	
Levonorgestrelum	52 mg	Sistem cu cedare intrauterină		G03AC03	
22.1.4 Metode de barieră					
Prezervative					
Diafragme					
22.1.5 Contraceptive implantabile					
Etonogestrelum	68 mg	Implant contraceptiv		G03AC08	* Încărcat într-un aplicator de unică folosință cu conținut de 68 mg Etonogestrel
Levonorgestrelum	75 mg	Implant contraceptiv		G03AD01	* Încărcat în 2 aplicatoare de unică folosință cu conținut a câte 75 mg Levonorgestrel fiecare
22.1.6 Contraceptive intravaginale					
Progesteronum (inel vaginal)	2.074 g progesteron micronizat	Inel vaginal		G03DA04	*Pentru administrare la femei care alăptează de cel puțin 4 ori pe zi.
22.2 Inductori ai ovulației					
Lista complementară					
Clomifenum	50mg	comprimate		G03GB02	
22.3 Uterotonice					
Carbetocinum	100 mcg/ml	sol. inj.		H01BB03	
Ergometrinum	200 mcg/ml 1 ml	sol. inj.			
				G02AB03	□ Alternativă terapeutică - Methylergometrinum

Mifepristonium	200 mg	Comprimat (1)		G03XB01	* Mifepriston 200 mg combinat cu Misoprostol 200 mcg
Misoprostolum	200 mcg	Comprimat (4)			
Mifepristonium	200 mg	Comprimat (1)		G03XB01	* Mifepriston 200 mg combinat cu Misoprostol 200 mcg
Misoprostolum	200 mcg	Comprimat vaginal (4)		G03XB01	
Mifepristonium	200mg	comprimat		G03XB01	
Mifepristonium	50 mg	comprimat		G03XB01	
Misoprostolum	200 mcg	comprimat		G02AD06	* Se administrează în caz de avort incomplet sau avort spontan; În profilaxia și tratamentul hemoragiilor postpartum în cazul în care Oxitocina nu este disponibilă sau în cazul unor eventuale riscuri ale administrării acesteia
Misoprostolum	25 mcg	Forme farmaceutice solide pentru administrare intravaginală		G02AD06	*Doar în instituții medicale specializate pentru inducerea travaliului
Oxytocinum	10 UI/ml	sol. inj./perf.		H01BB02	
	5 UI/ml	Sol. Inj.		H01BB02	

22.4 Antioxitoci (tocolitici)

Nifedipinum	10 mg	Forme orale solide		C08CA05	
	20 mg	Forme orale solide		C08CA05	
	40 mg	Forme orale solide		C08CA05	
	1 mg/ml	Sol. Inj.		C08CA05	

22.5 Alte medicamente administrate mamei

Dexamethasonum	4 mg/ml	sol. inj.		H02AB02	
Acidum tranexamicum	100 mg/ml	sol. inj.		B02AA02	
	500 mg	comprimate		B02AA02	
Suplimente cu micronutrient multiple		comprimate			Vitamin A (retinol acetate) 800 micrograms retinol activity equivalent Vitamin C (ascorbic acid) 70 mg Vitamin D (cholecalciferol) 5 micrograms (200 IU) Vitamin E (alpha tocopherol succinate) 10 mg alpha tocopherol equivalent Vitamin B1 (thiamine mononitrate) 1.4 mg Vitamin B2 (riboflavin) 1.4 mg Vitamin B3 (niacinamide) 18 mg niacin equivalent Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) 1.9 mg Folic acid (folic acid) 680 micrograms dietary folate equivalent (400 micrograms) Vitamin B12 (cyanocobalamin) 2.6 micrograms Iron (ferrous fumarate) 30 mg Iodine (potassium iodide) 150 micrograms Zinc (zinc oxide) 15 mg Selenium (sodium selenite) 65 micrograms Copper (cupric oxide) 2 mg

22.6 Medicamente administrate nou-născutului [c]

Caffeinum citras	20mg/ml (echivalent cu 10 mg Caffeina/ml)	sol. inj.		N06BC01	[c]
	20mg/ml (echivalent cu 10 mg Caffeina/ml)	pic. orale, soluție		N06BC01	[c]
Chlorhexidinum	7.1% (care contine 4% Chlorhexidinum pentru ingrijirea cordonului ombilical)	Solutie sau Gel		D09AA12	[c]

Lista complementară

Ibuprofenum	5 mg/ml	sol. inj./perf.		M01AE01	[c] □ Alternativă terapeutică - Indometacinum
Prostaglandin E1	0.5 mg/ml în alcool	sol. inj.		G02AD	[c] □ Alternativă terapeutică - Prostaglandinum E2
Surfactanți	25 mg/ml	suspensie pentru instilație endotraheo-pulmonara		R07AA02	[c]
	27 mg/ml	suspensie pentru instilație endotraheo-pulmonara		R07AA02	[c]
	80 mg/ml	suspensie pentru instilație endotraheo-pulmonara		R07AA	[c]

23. Soluție de dializă peritoneală

Soluție pentru dializă intraperitoneală		sol. inj./perf.		B05DA	
--	--	-----------------	--	-------	--

24 Medicamente pentru tulburări psihice și comportamentale
Lista complementară

Donepezilum	5 mg	comprimate		N06DA02	
	10 mg	comprimate		N06DA02	
Memantinum	10 mg	comprimate		N06DX01	

24.1 Medicamente utilizate în tulburările psihotice					
Amisulpridum	200 mg	comprimate		N05AL05	
Chlorpromazinum	25 mg/ml	sol. inj.		N05AA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	25 mg/5 ml	Forme orale lichide		N05AA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	100 mg	comprimate		N05AA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
Fluphenazinum	25 mg/ml	sol. inj.		N05AB02	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu structură piperazinică - cod N05AB https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
Haloperidolum	5 mg/ml	sol. inj.		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	2mg	comprimate		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	5mg	comprimate		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	1,5 mg	comprimate		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0,50%	soluție orală		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	50 mg/ml	soluție injectabilă		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
Paliperidonum	3 mg	comprimate cu eliberare prelungită		N05AX13	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte antipsihotice - cod N05AX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	6 mg	comprimate cu eliberare prelungită		N05AX13	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte antipsihotice - cod N05AX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	25 mg	susp. inj.		N05AX13	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte antipsihotice - cod N05AX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	50 mg	susp. inj.		N05AX13	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte antipsihotice - cod N05AX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	75 mg	susp. inj.		N05AX13	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte antipsihotice - cod N05AX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	100 mg	susp. inj.		N05AX13	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte antipsihotice - cod N05AX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	150 mg	susp. inj.		N05AX13	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte antipsihotice - cod N05AX https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

Sertralinum	50 mg	comprimate		N06AB06	
Sulpiridum	50 mg	comprimate		N05AL01	
	100 mg	comprimate		N05AL01	
	200 mg	comprimate		N05AL01	
Lista complementară					
Chlorpromazinum	25 mg/ml 2 ml	sol. inj.		N05AA01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	25 mg/5 ml	pic. orale, soluție		N05AA01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	100 mg	comprimate		N05AA01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	10 mg	comprimate		N05AA01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	25 mg	comprimate		N05AA01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	50 mg	comprimate		N05AA01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
Clozapinum	25 mg pînă la 200 mg	Forme orale solide		N05AH02	
Haloperidolum	5mg/ml 1 ml	sol. inj.		N05AD01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	50 mg/1 ml	sol. inj.		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	2 mg/ml	soluție orală		N05AD01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0.5% 195 ml	soluție orală		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0.5 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		N05AD01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	2 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		N05AD01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	1,5 mg	comprimate		N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	5 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată		N05AD01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

24.2 Medicamente utilizate în tulburări de dispoziție

24.2.1 Medicamente utilizate în tulburările depresive

Amitriptylinum	25 mg	Forme orale solide		N06AA09	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Inhibitori neselectivi ai recaptării monoaminei - cod N06AA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=N06AA&showdescription=no
	75 mg	comprimate		N06AA09	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Inhibitori neselectivi ai recaptării monoaminei - cod N06AA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=N06AA&showdescription=no
	20 mg/2 ml	sol. inj.		N06AA09	
Fluoxetinum	20 mg	Forme orale solide		N06AB03	□ Alternativă terapeutică - Citalopramum, Escitalopramum, Fluvoxaminum, Paroxetinum, Sertralinum
Cariprazinum	1.5 mg	capsule		N05AX15	
	3 mg	capsule		N05AX15	
Duloxetinum	30 mg	Forme orale solide		N06AX21	
	60 mg	Forme orale solide		N06AX21	
Mirtazapinum	30 mg	comprimate		N06AX11	
Quetiapinum	200 mg	comprimate		N05AH04	
	25 mg	comprimate		N05AH04	
Venlafaxinum	37,5 mg	Forme orale solide		N06AX16	
	75 mg	Forme orale solide		N06AX16	
	150 mg	Forme orale solide		N06AX16	

Lista complementară

Fluoxetinum	20 mg	Forme orale solide		N06AB03	□ Alternativă terapeutică - Citalopramum,
-------------	-------	--------------------	--	---------	---

24.2.2 Medicamente utilizate în tulburările bipolare

Aripiprazolum	5 mg	comprimate		N05AX12	
	10 mg	comprimate		N05AX12	
	15 mg	comprimate		N05AX12	
Carbamazepinum	100 mg	Forme orale solide		N03AF01	
	150 mg	Forme orale solide		N03AF01	
	200 mg	Forme orale solide		N03AF01	
	300 mg	Forme orale solide		N03AF01	
	400 mg	Forme orale solide		N03AF01	
	600 mg	Forme orale solide		N03AF01	
	100 mg/5ml	susp. orală		N03AF01	
Lithium carbonate	300mg	Forme orale solide		N05AN01	
Acidum valproicum (Natrium valproatum)	100 mg	Forme orale solide		N03AG01	
	150 mg	Forme orale solide		N03AG01	
	200 mg	Forme orale solide		N03AG01	
	300 mg	Forme orale solide		N03AG01	
	500 mg	Forme orale solide		N03AG01	
	600 mg	Forme orale solide		N03AG01	
	1000 mg	Forme orale solide		N03AG01	
	300 mg/5 ml	Forme orale lichide		N03AG01	
Natrium valproatum	57,64 mg/ml	Forme orale lichide		N03AG01	
Olanzapinum	10 mg	comprimate		N05AH03	

Quetiapinum	200 mg	comprimate		N05AH04	
	25 mg	comprimate		N05AH04	

24.3 Medicamente pentru tulburări de anxietate

Diazepamum	2 mg	Forme orale solide		N05BA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de benzodiazepine - cod N05BA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	5 mg	Forme orale solide		N05BA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de benzodiazepine - cod N05BA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	5 mg/2,5 ml	Soluție rectală		N05BA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de benzodiazepine - cod N05BA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	10 mg/2.5 ml	Soluție rectală		N05BA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de benzodiazepine - cod N05BA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	10 mg/2 ml	sol. inj.		N05BA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de benzodiazepine - cod N05BA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
Hydroxyzinum	25 mg	comprimate		N05BB01	

24.4 Medicamente utilizate pentru tulburări obsesiv-compulsive

Clomipraminum	10mg	Forme orale solide		N06AA04	
	25mg	Forme orale solide		N06AA04	
	25 mg/2 ml	sol. Inj.		N06AA04	

24.5 Medicamente pentru tulburări datorate consumului de substanțe psihoactive

Bupropionum	150 mg	Forme orale solide		N06AX12	
Terapia de înlocuire a nicotinei (NRT) (sub formă de polacrilex)	2 mg	guma masticabilă		N07BA	
	4 mg	guma masticabilă		N07BA	
	(5 mg-30 mg)/16 ore	Sistem terapeutic transdermic		N07BA	
	(7 mg-21 mg)/24 ore	Sistem terapeutic transdermic		N07BA	
Vareniclinum	0.5 mg	comprimate		N07BA03	
Vareniclinum	1 mg	comprimate		N07BA03	
Lista complementară					
Disulfiramum	150 mg	Forme orale solide		N07BB01	
	500 mg	Forme orale solide		N07BB01	
Flumazenilum	0.01%	sol. Inj.		V03AB25	
Naltrexonum	50 mg	comprimate		N07BB04	
	5 mg/5 ml	Soluție orală		N07BC02	trebuie utilizat numai în cadrul unui program specializat de suport.
	10 mg/5 ml	Soluție orală		N07BC02	trebuie utilizat numai în cadrul unui program specializat de suport.
	5 mg/ml	Conc./sol. orală		N07BC02	trebuie utilizat numai în cadrul unui program specializat de suport.

Methadonum	10mg/ml	Conc./sol. orală		N07BC02	trebuie utilizat numai în cadrul unui program specializat de suport.
	5 mg/ml	Soluție orală		N07BC02	trebuie utilizat numai în cadrul unui program specializat de suport.
	5 mg	comprimate		N07BC02	trebuie utilizat numai în cadrul unui program specializat de suport.
	10 mg	comprimate		N07BC02	trebuie utilizat numai în cadrul unui program specializat de suport.

25. Medicamente care acționează asupra căilor respiratorii

Lista complementară					
Butamiratum	0,50%	pic. orale, soluție		R05DB13	
	7.5 mg/5 ml	Forme orale lichide		R05DB13	
	15 mg/5 ml	Forme orale lichide		R05DB13	
Dextromethorphanum	6,6 mg/5 ml	Forme orale lichide		R05DA09	
	27 mg/15 ml	Forme orale lichide		R05DA09	

25.1 Antiastmatice și medicamente pentru boala pulmonară obstructivă cronică

Budesonidum	100 mcg /doză	sol. de inhalat presuriz.		R03BA02	[c] □ Alternativă teapeutică - Beclometasonum, Ciclosonidum, Flunisolidum, Fluticasonum, Mometasonum
	200 mcg / doză	sol. de inhalat presuriz.		R03BA02	[c] □ Alternativă teapeutică - Beclometasonum, Ciclosonidum, Flunisolidum, Fluticasonum, Mometasonum
	100 mcg/doza	spray naz., soluție		R03BA02	[c] □ Alternativă teapeutică - Beclometasonum, Ciclosonidum, Flunisolidum, Fluticasonum, Mometasonum
Formoterolum + budesonidum	100 mcg + 6 mcg/doză	Pulb. uscată pentru inhalare		R03AK07	□ Alternativă teapeutică - - Beclometasonum + Formoterolum - Budesonidum + Salmeterolum - Fluticasonum + Formoterolum - Fluticasonum furoas + Vilanterolum - Mometasonum + Formoterolum
	200 mcg + 6 mcg/doză	pulb. uscată pentru inhalare		R03AK07	□ Alternativă teapeutică - - Beclometasonum + Formoterolum - Budesonidum + Salmeterolum - Fluticasonum + Formoterolum - Fluticasonum furoas + Vilanterolum - Mometasonum + Formoterolum
Epinephrinum	1 mg/ml	sol.inj		R03AA01	
	0,182%	sol.inj		C01CA24	
Formoterol	12 mcg	pulb. uscată pentru inhalare		R03AC13	
Ipratropii bromidum	20 mcg /doză	sol. de inhalat prin nebulizator		R03BB01	
Ipratropii bromidum + Fenoterolum	20 mcg + 50 mcg	sol. de inhalat presurizata		R03AL01	
Salbutamolum	100 mcg/doză	susp. de inhalat presuriz.		R03AC02	□ Alternativă teapeutică - Terbutalinum
	50 mcg/ml	sol. inj.		R03AC02	□ Alternativă teapeutică - Terbutalinum
	100 mcg/doză	sol. de inhalat cu ajutorul unui inhalator dozator		R03AC02	□ Alternativă teapeutică - Terbutalinum
	5 mg/ml	sol. de inhalat prin nebulizator		R03AC02	□ Alternativă teapeutică - Terbutalinum
	2 mg/5ml	Forme orale lichide		R03AC02	□ Alternativă teapeutică - Terbutalinum
	2 mg	comprimate		R03AC02	□ Alternativă teapeutică - Terbutalinum
	4 mg	comprimate		R03AC02	□ Alternativă teapeutică - Terbutalinum
Salmeterolum + Fluticasonum	25 mcg+50 mcg/doza	suspensie de inhalat presurizată		R03AK06	
	25mcg+125 mcg/doza	suspensie de inhalat presurizată		R03AK06	
	25mcg+250 mcg/doza	suspensie de inhalat presurizată		R03AK06	
	50 mcg+100 mcg/doza	pulb./inhalat		R03AK06	
	50 mcg+250 mcg/doza	pulb./inhalat		R03AK06	
	50 mcg+500 mcg/doza	pulb./inhalat		R03AK06	

Tiotropii bromidum	18 mcg	Pulbere pentru inhalare		R03BB04	Umeclidium
	18 mcg	capsule		R03BB04	Umeclidium
	1.25 mcg	Sol. de inhalat		R03BB04	Umeclidium
	2.5 mcg	Sol. de inhalat		R03BB04	Umeclidium
Aminophyllinum	150 mg	comprimate		R03DA05	
	2,4% 5 ml	sol. inj.		R03DA05	
Montelukast	4 mg	Forme orale solide		R03DC03	* astm bronșic la copii 2-5 ani
	5 mg	Forme orale solide		R03DC03	* astm bronșic la copii 6-14 ani
	10 mg	Forme orale solide		R03DC03	* astm bronșic la copii 15-18 ani

26. Soluții de corectare a tulburărilor de apă, electroliți și acido-bazice

26.1 Oral

Saruri pentru rehidratare orală					Conform compartimentului 17.5.1
Kalii chloridum (Potassium chloride)		pulbere pentru soluție		A12BA01	

26.2 Parenteral

Glucosum	5%	sol. inj./sol. perf. (izotonica)		B05CX01	
	10%	sol. inj./sol. perf. (hipertonica)		B05CX01	
	40%	sol. inj.		B05CX01	
	50%	sol. inj./sol. perf. (hipertonica)		B05CX01	
Glucosum + Natrii chloridum	4% glucoza + 0,18% clorură de sodium (echivalent cu Na+ 30 mmol/L, Cl- 30 mmol/L).	sol. inj./sol. perf.		B05CX01	
	5% glucoza + 0,9% clorură de sodium (echivalent cu Na+ 150 mmol/l si Cl- 150 mmol/l)	sol. inj./sol. perf.		B05CX01	
	5% glucoza + 0,45% clorură de sodium (echivalent cu Na+ 75 mmol/l si Cl- 75 mmol/l)	sol. inj./sol. perf.		B05CX01	[c]
Kalii chloridum (Potassium chloride)	11,2% 20ml (echivalent cu K+ 1,5mmol/ml, Cl- 1,5mmol/ml)	sol.inj.		B05XA01	
	7,5% (echivalent la K+ 1mmol/ml, Cl- 1mmol/ml)	Sol. pentru dilutie		B05XA01	[c]
	15% (echivalent cu K+ 2mmol/ml, Cl- 2mmol/ml)	Sol. pentru dilutie		B05XA01	[c]
	40mg/ml	sol.inj.		A12BA01	
	22,5%	Concentrat/sol.perfuz.		B05XA01	
Natrii chloridum (Sodium chloride)	0,9% izotonică (echivalent cu Na+154mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	sol. inj./perf.		B05XA03	
Natrii bicarbonas/ Natrii hydrocarbonatis (sodium hydrogen carbonate)	1.4% izotonică (echivalent cu Na+167mmol/L, HCO3- 167 mmol/L)	sol. inj.		B05XA03	

Natrii bicarbonas/ Natrii hydrocarbonatis (sodium hydrogen carbonate)	8.4% 10 ml (echivalent cu Na+ 1000mmol/L, HCO3- 1000 mmol/L)	Solutie		B05XA03	
Sodium Lactate (solutie compusa)		sol. perf.		B05XA	□
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas (analog Hartman)		sol. perf.		B05BB01	
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas		sol. perf.		B05BB01	
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum		sol. perf.		B05BB01	
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii acetat		sol. perf.		B05BB01	
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii hydrocarbonas		sol. perf.		B05BB01	
Gelatinum succilinat+ Natrii chloridum+ Natrii hydroxydum+ Aqua pro injectionibus		sol. perf.		B05AA06	
Combinatie de aminoacizi		sol. perf.		B05BA01	

26.3 Diverse

Aqua pro injectionibus (Apa pentru injectii)	2ml; 5ml; 10ml	sol. inj.		V07AB	
--	----------------	-----------	--	-------	--

27. Vitamine și minerale

Acidum ascorbicum	25 mg	Forme orale solide		A11GA01	
	50 mg	Forme orale solide		A11GA01	
	100 mg	Forme orale solide		A11GA01	
	500 mg	Forme orale solide		A11GA01	
	5%	sol. inj.		A11GA01	
	10%	sol. inj.		A11GA01	
Calcium	500 mg	comprimate		A12AA	
Calcium + Cholecalciferolum		Forme orale solide		A12AX	
Calcii chloridum	100 mg/ml	sol. inj.		B05XA07	
Calcii gluconas	500 mg	comprimate		A12AA03	
	100 mg/ml	sol. inj.		A12AA03	
Cholecalciferolum	400 UI/ml	pic. orale, soluție		A11CC05	[c] □ Alternativă terapeutică - Ergocalciferolum
	400 UI	forme orale solide cu eliberare imediata		A11CC05	[c] □ Alternativă terapeutică - Ergocalciferolum
	1000UI	forme orale solide cu eliberare imediata		A11CC05	[c] □ Alternativă terapeutică - Ergocalciferolum
	15000 UI/ml 10ml	Picături orale		A11CC05	[c] □ Alternativă terapeutică - Ergocalciferolum
Cyanocobalaminum	0.5 mg/ml	sol. inj.		B03BA01	
Iodum (ulei iodat)	1 ml (480 mg iod)	sol. Orală sau sol. Inj.		D08AG03	
	0,5ml (240mg iod)	sol. Orală sau sol. Inj.		D08AG03	
Iodum	0,57 ml (308mg iod)	sol. Orală (in sticla dozatoare=dispenser bottle)		D08AG03	
	190 mg	capsule		D08AG03	

Pulbere micronutrienți					[c] *12.5 mg fier elementar (sub forma de fumarat de fier), 5 mg zinc elementar, 300 mcg vit. A, cu sau fara alti micronutrienti in doze zilnice recomandate
Nicotinamidum	50 mg	comprimate		A11HA01	
Pyridoxinum	25 mg	comprimate		A11HA02	
	50 mg/ml	sol. inj.		A11HA02	
Retinolum	50 000 UI	capsule		A11CA01	
	100 000 UI	capsule		A11CA01	
	200 000UI	capsule		A11CA01	
	100 000 UI/ml	Sol. Uleoasa orala (in dozator multi-doza)		A11CA01	
	100 000 UI/2ml	sol. inj. hidrofila		A11CA01	
	10 000 UI	comprimate (acoperite cu zahar)		A11CA01	
	100 000UI	pic. orale, sol.		A11CA01	
	50000 UI/ml	picaturi orale, solutie		A11CA01	
Riboflavinum	5 mg	comprimate		A11HA04	
Thiaminum	50 mg/ml	sol. inj.		A11DA01	
	50 mg	comprimate		A11DA01	
Tocopherolum	100 mg	capsule		A11HA03	
	200 mg	capsule		A11HA03	
	400 mg	capsule		A11HA03	

Lista complementară

Acidum nicotinicum	10 mg/ml	sol. inj.		C04AC01	
	50 mg	comprimate		C04AC01	

28. Medicamente pentru urechi, nas și gât

Acidum aceticum	2%	soluție uz extern (in alcool)		S02AA10	[c]
Budesonidum	100 mcg/doza	spray naz., sol.		R01AD05	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Corticosteroizi - cod R01AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	100 mcg /doză	sol. de inhalat presuriz.		R03BA02	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Corticosteroizi - cod R01AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	200 mcg /doză	sol. de inhalat presuriz.		R03BA02	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Corticosteroizi - cod R01AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
Ciprofloxacinum	0,3%	pic. oft., sol.		S01AE03	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fluorochinolone - cod ATC S01AE https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0,30%	unguent oftalmic		S03AA07	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fluorochinolone - cod ATC S01AE https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
Xylometazolinum	0,05%	Spray nazal, soluție		R01AA07	[c] Copii>3 luni □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Simpatomimetice - cod ATC R01AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0,05%	pic. nazale, soluție		R01AA07	[c] Copii>3 luni □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Simpatomimetice - cod ATC R01AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0,1%	spray nazal, soluție		R01AA07	[c] Copii>3 luni □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Simpatomimetice - cod ATC R01AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0,1%	pic. nazale, soluție		R01AA07	[c] Copii>3 luni □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Simpatomimetice - cod ATC R01AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

Lista complementară					
Cholini salicylas	200 mg/g	Picaturi auriculare, solutie		S02DA	
Phenazonum + Lidocainum		Picaturi auriculare, solutie		S02DA30	
29. Medicamente pentru tratamentul bolilor articulare					
29.1 Medicamente pentru tratamentul gutei					
Colchicinum	1 mg	comprimate		M04AC01	
Allopurinolum	100 mg	comprimate		M04AA01	
	300 mg	comprimate		M04AA01	
29.2 Agenți modifikatori ai bolii utilizați în tulburările reumatoide					
Chloroquinum	100 mg	comprimate		P01BA01	
	150 mg	comprimate		P01BA01	
Lista complementară					
Azathioprinum	50 mg	comprimate		L04AX01	
Hydroxychloroquinum	200 mg	Forme solide orale cu eliberare imediata		P01BA02	[c]
	200 mg	comprimate		P01BA02	
Methotrexatum	2.5 mg	comprimate		L04AX03	
	10 mg	comprimate		L04AX03	
	10 mg/ml	sol. inj.		L04AX03	
	25 mg/ml	sol. inj.		L04AX03	
	50 mg/ml	pulb./sol. inj.		L04AX03	
	500 mg/5 ml	conc./sol.perfuz.		L04AX03	
Penicillaminum	250 mg	Forme solide orale		M01CC01	
Sulfasalazinum	500 mg	Forme solide orale		A07EC01	☐ Alternativă terapeutică - Mesalazinum
	500 mg	supozitoare		A07EC01	☐ Alternativă terapeutică - Mesalazinum
29.3 Boli articulare juvenile					
Golimumabum	45 mg/0,45 ml	sol. inj.		L04AB06	
	50 mg/0,5 ml	sol. inj.		L04AB06	
Tocilizumabum	20 mg/ml	sol. inj. (i/v)		L04AC07	
Tocilizumabum	162 mg/0.9 ml	sol. inj. (s/cutanat)		L04AC07	
Lista complementară					
Acidum acetylsalicylicum	50 mg - 150 mg	supozitoare		N02BA01	Pentru tratamentul febrei reumatoide, artritei juvenile, bolii Kawasaki
	100 mg până la 500 mg	comprimate		N02BA01	Pentru tratamentul febrei reumatoide, artritei juvenile, bolii Kawasaki
30. Medicamente dentare					
Fluor	1000 ppm (părți per milion)	paste, cremă și gel sau alte forme		A12CD	
	1500 ppm (părți per milion)	paste, cremă și gel sau alte forme		A12CD	
Ciment ionomer de sticla	0.4 g pulbere + 0.09 ml lichid				Powder (fluoro-alumino-silicate glass) contains: 25-50% silicate, 20-40% aluminium oxide, 1-20% fluoride, 15-40% metal oxide, 0-15% phosphate, remainder are polyacrylic acid powder and metals in minimal quantities. Liquid (aqueous) contains: 7-25% polybasic carboxylic acid, 45-60% polyacrylic acid
	pulbere + lichid	capsule de unică folosință flacon reutilizabil			
Fluorură de diamină de argint	38%	soluție			