


**Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
PRIVIND IGIENA MÎNILOR**

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	IMSP Institutul de Medicină Urgentă Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.

Nr. crt.	Elemente privind responsabil/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
					5
1	2	3	4		
1.1.	Aprobat	Manea Diana	Director al IMSP IMU	26.02.2025	
1.2.	Verificat	Maxim Igor	Vicedirector medical	25.02.2025	
1.3.	Verificat	Vovc Liviu	Responsabil de managementul calității serviciilor medicale	17.02.2025	
1.4.	Elaborat	Pinteac Olga	Asistenta medicală șefă	14.02.2025	
1.5.	Elaborat	Tuchila Valentina	Asistentă medicală superioară s. microchirurgie	12.02.2025	

1. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale.

Nr. Crt.	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
				4
1	2	3		
2.1.	Ediția 1	Mai multe componente a procedurii respective	Documente noi elaborate de MS	03.10.2023
2.2.	Revizia 1			26.02.2025

3. Nominalizarea persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.

Toți angajații din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

4. Scopul procedurii:

- Procedura are drept scop descrierea asepsiei mîinilor, indicațiile acesteia după gradul de risc infecțios, utilizarea corectă a antisepticelor, astfel încât activitatea medicală să se desfăsoare în condiții de securitate atât pentru pacient cât și pentru personalul medical;
- Prevenirea infectiilor asociate asistenței medicale;
- Prin respectarea acestei proceduri, implicit va crește gradul de satisfacție al pacienților și a calității actului medical.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale respective:

Procedura se aplică în toate departamentele, secțiile și serviciile din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către tot personalul din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

6. Documente de referință aplicabile procedurii operaționale respective:

- SR EN ISO 9001:2008, actualizat în 2015 – Sistem de management al calității. Principii fundamentale și cerințe de bază;
- **SR ISO IWA 1:2009** - Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru îmbunătățiri de proces în organizațiile de servicii de sănătate;
- **SR CEN/TS 15224:2007** - Servicii de sănătate. Sisteme de management al calității. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001.

6.1. Reglementări internaționale:

- Regulamentul UE nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană.

6.2. Reglementări naționale:

- Legea ocrotirii sănătății Nr.411-XII din 28.03.1995;
- Legii nr.263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului;
- Legii nr.264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiei de medic;
- Reglementari și norme interne;
- Ghidul OMS;
- Ghidul practic „Siguranta injectiilor” aprobat prin ordinul MS nr.765 din 30.09.2015<
- Ghiduri pentru prevenirea rezistenței multibacteriene;
- Ghid de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale (aprobat prin ordinul MS nr.51 din 06.02.09);
- Ghiduri privind asistența spitalicească

6.3. Reglementări secundare:

- Ordinul MS nr.567 din 17 iunie 2021 „Cu privire la aprobatarea Listei indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice și modului de evaluare a îndeplinirii acestora”.

6.4. Reglementări interne:

- Organograma IMSP Institutul de Medicină Urgentă;
- Regulamentul de organizare și funcționare al IMSP Institutul de Medicină Urgentă;
- Ordinul IMSP IMU nr.93 din 08 iunie 2017 „Cu privire la implementarea procedurii cadru privind elaborarea procedurilor în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă”;
- Circuitul documentelor, inclusiv cele electronice, aprobat la nivelul IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

7. Definitii si abrevieri ale termenilor:

7.1. Definitii ale termenilor

Nr.	Termenul	Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul.
1.	Procedura operațională	Procedura care descrie un proces sau o activitate. care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente.
2.	Antiseptic	Produsul biocid care fie inhibă dezvoltarea fie distrugă microorganismele la nivelul tegumentelor, mucoaselor incât pentru prevenirea infectiilor.
3.	Sapun antiseptic	Sapun care conține un agent antiseptic în concentrație suficientă pentru a inactiva agentii patogeni și/sau reducerea înmulțirii acestora.
4.	Flora rezistentă	Flora care există la nivelul tegumentelor pielii și care reprezintă o barieră împotriva colonizării cu agenți patogeni din exterior; agenții patogeni ai florei cutanate pot fi implicați în producerea infectiilor asociate ingrijirilor medicale

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

5	Flora tranzitorie	Flora cu care se contamineaza tegumentul mainii in timpul actelor de ingrijire medicala este reprezentata de cele mai multe ori de agenti patogeni rezistenti la antibiotice; acestia provin din tubul digestiv; mediu, ei jucand un rol important in producerea infectiilor asociate ingriiirilor medicale.
6	Curatare	Etapa preliminara obligatorie permanenta si sistemica in cadrul oricarei activitatii sau proceduri de indeparlare a murdariei (materie organic si anorganica) de pe suprafete(inclusiv tegumente) sau obiecte prin operatiuni mecanice sau manual, utilizandu-se agenti fizici si /sau chimici care se efectueaza in unitatile sanitare de orice tip, astfel incat activitatea medicala sa se desfaseoare in conditii optime de securitate.

7.2 Abrevieri ale termenilor-exemple

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	2	3
7.2.1.	PO	Procedură operațională
7.2.2.	E	Elaborare
7.2.3.	V	Verificare
7.2.4.	A	Aprobare
7.2.5.	Ap	Aplicare
7.2.6.	Ah	Arhivare
7.2.7.	EN	Standard european
7.2.8.	ISO	Organizația internațională pentru standardizare
7.2.9.	CSPLIAAM	Compartiment de supraveghere, preventie si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale .
7.2.10.	IAAM	Infectii asociate asistentei medicale

8. Descrierea prezentei proceduri operaționale:

Fundamentare:

Transmiterea microorganismelor prin intermediul mainilor personalului medical este principala cauza a aparitiei a infectiilor asociate asistentei medicale, iar igiena mainilor personalului medical ramane cea mai importanta masura pentru prevenirea si limitarea acestor infectii.

Igiena mainilor reprezinta cea mai simpla, cea mai eficienta si dovedita metoda de a reduce incidenta infectiilor asociate asistentei medicale.

Flora microbiana a mainilor poate fi:

- tranzitorie supraviețuiește perioade scurte de timp (E.coli, Klebsiella, Pseudomonas, Salmonella, Rotavirus, Albicans, inclusiv tulpini spitalicești);
- rezistenta - flora stafilococica;
- infecțioasa - cuprinde microorganisme ce produc infecții ale pielii (panaritii).

Nu se recomanda manichiura sau unghiile lungi, purtarea de bijuterii sau ciasuri de mină.

Mainile constituie cai de transmitere pentru aproape orice fel de agenti patogeni de la un pacient la altul, sau de la un membru al personalului la pacient. Astfel, igiena mainilor este cea mai importanta procedura de prevenire a infectiei. Pentru a proteja pacientii de infectiile asociate asistentei medicale, igiena mainilor trebuie să se realizeze periodic și complet. Într-adevăr, mainile curate și sănătoase, cu pielea intactă, cu unghiile tăiate, și fără înele minimalizează, riscul contaminării. Nu numai unghiile artificiale pot fi adesea depozite de microorganisme ci și mainile aspre și cu pielea crăpată.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

Intreg personalul trebuie să mentina o igienă personală adecvată. Unghiile trebuie tăiate scurt și pastrate curate. Este interzisă purtarea unghiilor false. Parul trebuie tuns scurt sau prinat. Personalul de sex masculin trebuie să poarte barba și mustață tăiate scurt și curate.

Materiale necesare :

- sapun lichid;
- produs pentru dezinfecția igienică a mainii prin frictiune;
- produs antiseptic pentru dezinfecția chirurgicală a mainilor prin frictiune;
- produs antiseptic pentru dezinfecția chirurgicală a mainilor prin spalare;
- produs pentru spalarea chirurgicală a mainilor cu pvp;
- prosoape de hartie ;
- perie de unghii, burete de plastic.

Procedura generală - implementare

- Se vor înlaatura inelele pentru că ele adăpostesc murdarie și microorganisme; unghiile naturale trebuie să fie tăiate, scurte și curate;
- Se vor uda mainile și încheieturile mainilor cu apă caldă și se va aplica sapunul. Nu se va folosi sapun solid pentru că acesta permite transmiterea infecției. Se vor tine mainile cu cotul în sus pentru a impiedica apă să se duca în sus pe maini și apoi în jos, contaminând astfel zonele curate;
- Se vor freca puternic mainile cu multă spuma de sapun cam 10 secunde. Sapunul și apă caldă reduc tensiunea suprafetei și aceasta, ajutată de frecare, slabeste microorganismele care vor fi îlăturate împreună cu spuma;
- Se va acorda o atenție deosebită zonelor de sub unghii și zonelor cuticulelor, precum și degetului mare și partilor laterale ale degetelor și mainilor pentru că aceste zone sunt propice dezvoltării microorganismelor;
- Se va evita stropirea accidentală cu apă pe propriile haine cît și pe podea deoarece microorganismele se raspandesc mai usor pe suprafete umede și totodată podelele alunecoase sunt periculoase;
- Se va evita să se atingă chiuveta și robinetele deoarece ele se consideră a fi contaminate;
- Se vor clăti mainii și încheieturile mainilor foarte bine pentru că jetul de apă curgând să indeparteze spuma de sapun cu impuritățile și microorganismele existente;
- Se vor sterge mainile, tamponind bine cu un prosop de hirtie. Se va evita frecarea care poate cauza aspirarea mainilor;
- Dacă chiuveta nu este prevăzută cu un dispozitiv pentru genunchi sau picior de inchidere a apei, se vor închide robinetele apucindu-le cu un prosop de hirtie uscat pentru a evita recontaminarea mainilor.

DECONTAMINAREA MAINILOR

Decontaminarea mainilor se realizează în trei moduri:

- Spalarea simplă igienică a mainilor;
- Dezinfecția igienică a mainilor;
- Dezinfecția chirurgicală a mainilor.

Spalarea simplă igienică a mainilor

Scop:

- îndepărtarea murdariei;
- reducerea florei microbiene tranzitorii.

Durată: 30-60 secunde

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

Cerinte: apa de la robinet, sapun simplu preferabil lichid, hartie prosop, dispenser pentru hartie prosop.

Indicatii: inainte de masa, dupa folosirea toaletei, daca mainile sunt vizibil murdare.

Tehnica: tehnica celor 6 pasi

- se umezesc mai intai mainile cu apa;
- se aplică 3-5 ml sapun lichid pe maini;
- se freaca mainile impreuna pentru cel putin 15 secunde;
- se acopera toata suprafata mainilor si a degetelor;
- se clatesc bine mainile cu apa si se usuca bine cu prosop de hartie;
- se foloseste prosop de hirtie pentru a inchide robinetul.

Dezinfectia igienica a mainilor (anexa 1):

1. Dezinfecția mainilor prin spalare:

Scop:

- reducerea florei microbiene tranzitorii;
- reducerea florei microbiene rezidente.

Durata : 1-2 min (50-60 sec)

Cerinte: apa de la robinet, produs antiseptic (sapun lichid antibacterian) 3-5 ml, dispenser pentru sapun lichid, baterie de chiuveta cu sensor.

Indicatii:

- inainte si dupa contactul cu pacientul;
- imediat inainte de manevrele aseptice;
- dupa contactul cu fluide biologice, plagi sau tegumente lezate;
- dupa atingerea echipamentelor sau obiectelor din jurul pacientului;
- inainte si dupa scoaterea manusilor;
- se face imediat inaintea manevrei/imediat duna manevra.

Tehnica: tehnica celor 6 pasi

- se umezesc mai intai mainile cu apa;
- se aplică 3-5 ml sapun lichid pe maini;
- se freaca mainile impreuna pentru cel putin 15 secunde;
- se acopera toata suprafata mainilor si a degetelor;
- se clatesc bine mainile cu apa si se usuca bine cu prosop de hartie;
- se foloseste prosop de hirtie pentru a inchide robinetul.

2. Dezinfecția mainilor prin frecare:

Scop:

- eliminarea si/sau distrugerea florei microbiene tranzitorii;
- reducerea florei microbiene rezidente.

Durata: 30 secunde - 1 min (20-30 sec)

Cerinte: produs antiseptic; dispenser pentru solutie alcoolica.

Indicatii:

- inainte si dupa contactul cu pacientul;
- imediat inainte de manevrele aseptice;
- dupa contactul cu fluide biologice, plagi sau tegumente lezate;
- dupa atingerea echipamentelor sau obiectelor din jurul pacientului;
- inainte si dupa scoaterea manusilor;
- se face imediat inaintea manevrei/imediat dupa manevra
- .

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

Daca mainile nu sunt vizibil murdare sau contaminate cu sange/lichide biologice = maini curate, uscate si fara talc. Este precedata de o spalare cu apa si sapun lichid, in cazul mainilor vizibil murdare (mainile se spala inainte de aplicarea alcoolului).

Se asteapta uscarea alcoolului dupa aplicare!!!

Tehnica: tehnica celor 6 pasi

- se umezesc mai intai mainile cu apa;
- se aplică 3-5 ml sapun lichid pe maini;
- se freaca mainile impreuna pentru cel putin 15 secunde;
- se acopera toata suprafata mainilor si a degetelor;
- se clatesc bine mainile cu apa si se usuca bine cu prosop de hartie;
- se foloseste prosop de hirtie pentru a inchide robinetul.

Dezinfectia chirurgicala a mainilor (anexa 2):

1. Dezinfectia chirurgicala a mainilor prin frecare:

Scop:

- elirninarea si/sau distrugerea florei microbiene tranzitorii;
- reducerea florei microbiene rezidente.

Durata: 3-5min

Cerinte: produs antiseptic; aplicarea succesiva (3 doze) a cate 5 ml; dispenser pentru solutie alcoolica.

Tehnica:

- este precedata de o spalare cu apa sterilă si sapun antiseptic maini curate, uscate si fara talc;
- cu primele 2 doze se freaca mainile, pumnii, antebratele până la coate;
- la a 3 a doza, se parcurg cele 6 etape obligatorii pentru maini.

2. Dezinfectia chirurgicala a mainilor prin spalare:

Scop :

- eliminarea si/sau distrugerea florei microbiene tranzitorii;
- reducerea florei microbiene rezidente.

Durata: tehnica in 3 timpi (3 ori 2 min: 6 min)

Cerinte: produs antiseptic (sapun antimicrobian), 3 doze de sapun a cate 3-5 ml fiecare, apa sterilă, chiuveta cu senzoor, dispenser pentru sapun, perie pentru unghii daca sunt vizibil murdare, uscare cu prosop steril.

Indicatii :

- este precedata de indepartarea bijuteriilor si o spalare simpla;
- inaintea manevrelor invazive, chirurgicale, care au contact cu tesuturi sterile ale organismului;
- se recomanda sa nu se foloseasca peri; daca se folosesc, trebuie sa fie sterile, de unica utilizare.

Tehnica de spalare chirurgicala: pozitia ridicata a mainilor fata de antebrate.

Succesiunea decontamindrii:

- scoaterea ceasului si a bijuteriilor;
- umezirea mainilor si antebratelor cu apa potabila curgatoare,sapunirea minutioasa a mainilor cu sapun antiseptic,spatii interdigitale,peri si sununghial si antebratelor 30 sec;
- inlaturarea sapunului si murdariei cu apă potabila;

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

- uscarea minutioasa a mainilor cu servetel steril;
- prelucrarea unghiilor si pliurilor periunghiale;
- aplicarea antisepticului si frictionarea lui;
- solutia antiseptica se va afla in dispensere cu deschidere de catre cot sau picior;
- imbracarea de manugi sterile se face pe mana uscata.

Reguli de utilizare a antisepticelor:

- un produs antiseptic se utilizeaza numai in scopul pentru care afost avizat;
- se respecta intocmai indicatiile de utilizare de pe eticheta produsului;
- se respecta intocmai timpul de contact precizate in avizul produsului;
- pe flacon se noteaza data si ora deschiderii si data limita pana la care produsul poate fi utilizat in conformitate cu recomandarile producatorului;
- la fiecare utilizarc flaconul trebuie deschis si inchis corect. flaconul se manipuleaza cu atentie;
- in cazul flacoanelor cu antiseptic este interzisa atingerea gurii flaconului pentru a evita contaminarea;
- este interzisa transvazarea in alt flacon;
- este interzisa reconditionarea flaconului;
- este interzisa completarea unui flacon pe jumatare golit;
- este interzisa amestecarea precum si utilizarea succesiva a doua produse antiseptice diferite;
- sunt de preferat produsele conditionate in flacoane cu cantitate mica;
- se pastreaza numai in flacoanele originale pentru a evita contaminarea lor si pentru a nu pierde informatii de pe eticheta flaconului;
- flacoanele se pastreaza la adăpost de lumina si caldura.

Pentru a preveni situatia in care mainile devin uscate si crapate se aplica dupa fiecare spalare o crema emolienta sau se inlocuieste agentul de curatare cu un altul. Trebuie avut in vedere ca loliunea sau crema de maini folosita sa nu afecteze interiorul manusilor deteriorindu-le;

Daca apar dermatite la personalul medical, va trebui realizat o evaluare a medicului dermatolog pentru a stabili daca persoana respectiva mai poate lucra in mediul spitalicesc pana la vindecare.

Proceduri recomandate in functie de nivelul de risc:

Nivel de risc	Procedura	Indicatii
Minim	Spalarea mainilor sau Dezinfecția igienică a miinilor prin frecare	Cand mainile sunt vizibil murdare La inceputul și sfârșitul programului de lucru. Înainte și după scoaterea manusilor sterile sau nesterile Înainte și după contactul cu pacientii. Dupa utilizarea grupului sanitat inainte si dupa activitatile de curatenie

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

Interimar	<p>Dezinfectia igienica a mainilor prin frecare sau</p> <p>Dezinfectia igienica a mainilor prin spalare</p>	<p>Dupa contactul cu un pacient izolat septic.</p> <p>Inainte de realizarea unei proceduri invazive.</p> <p>Dupa orice contact accidental cu sangele sau alte lichide biologice</p> <p>Dupa contactul cu un pacient infectat si/sau cu mediul in care sta .</p> <p>Dupa toate manevrele potential contaminante .</p> <p>Inainte de contactul cu un pacient izolat profilactic.</p> <p>Inainte realizarii unei punctii lombare, abdominale, articulare sau similar</p> <p>inainte manipularii dispozitivelor Intravasculare, tuburi de dren, pleurale sau similar .</p> <p>In cazul manoperelor contaminante efectuate succesiv la acelasi pacient inainte si dupa ingriirea plagilor.</p>
Inalt	<p>Dezinfectia chirurgic mainilor prin frecare sau dezinfecția chirurgicala mainilor prin spalare.</p>	<p>Inainte de toate interventiile chirurgicale,</p> <p>Inaintea tuturor manevrelor care necesita o asepsie de tip chirurgical: montarea cateterelor centrale, punctii amniotice, rahidiene si alte situatii similar.</p>

Complicatii:

Deoarece indeparteaza grasimea naturala a pielii, spalarea frecventa a mainilor poate duce la uscarea mainilor si la iritatii. Aceste efecte sunt probabil si mai des intlnite in cazul folosirii repede a agentilor de curatare antiseptic mai ales la persoanele cu piele sensibila. De aceea trebuie clatit foarte bine dupa orice folosire in exces a agentilor de curatare, pentru a diminua riscul iritatilor.

Indicator de masurare a eficientei activitatii:

Numar probe sanitatie maini, cu rezultat pozitiv din total probele sanitatie maini, recoltate din fiecare sector de lucru, pe an.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității:

9.1. Medici, asistenții medicale și în genere toți angajații din cadrul IMSP IMU sunt responsabili pentru îndeplinirea acestei proceduri.

a. Responsabilul de proces – Președintele Consiliului Calității (CC) și asistenta medicală șefă:

- ✓ elaborează/revizuește/retrage procedura;
- ✓ coordonează aplicarea procedurilor de asigurare și evaluare a calității;
- ✓ gestionează elaborarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru.

b. Director IMSP Institutul de Medicină Urgentă:

- ✓ aproba procedura.

c. Vicedirectorul medical din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă:

- ✓ impune aplicarea procedurii;
- ✓ asigură resurse pentru aplicarea procedurii.

d. Responsabilii de proces:

- ✓ aplică și respectă procedura;
- ✓ difuzează procedură în cadrul compartimentului;
- ✓ organizează grupuri de lucru pentru discutarea și aplicarea procedurii.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

10. Anexe:

11. Cuprins:

Numărul componenței	Denumirea componenței din cadrul procedurii operaționale	Pag
1	Coperta	1
2	Lista responsabilitelor de elaborare	2
3	Nominalizarea responsabilitelor la care se difuzează ediția	2
4	Scopul	2
5	Domeniul de aplicare	2
6	Documente de referință	3
7	Definiții ale termenilor	3
8	Abrevieri	4
9	Descrierea procedurii	4
10	Decontaminarea mâinilor	5
11	Dezinfecția igienică a mâinilor + anexa 1	6
12	Dezinfectia chirurgicală a mâinilor + anexa 2	7
13	Reguli de utilizare a antisepticelor	8
14	Proceduri recomandate în funcție de nivelul de risc	8
15	Complicații	9
16	Responsabilități	9
17	Cuprins	10
18	Anexa 1: Cum se dezinfecțează corect	11
19	Anexa 2: Dezinfecția chirurgicală a mâinilor	12

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale
---	---


Anexa 1

Cum se dezinfecțează corect


1) Palmă în palmă




2) Palma cu dosul palmei




3) Palmă în palmă cu degetele desfăcute




4) mână în mână cu degetele îndoite



5) Cu palma inchisă la degetul cel mare




6) Cu vîrful degetelor în plamă



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura nr.03/57 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind igiena mâinilor	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale

Anexa 2

Dezinfecția chirurgicală a mâinilor



1. Aplică dezinfecțantul pe mâini, activa-ți dispensarul cu cotul
2. Prelucrați mâinile și antebrațele cu dezinfecțant timp de 90 de secunde
3. Folosiți medodele standarde igienice de dezinfecțare a mâinilor
4. Ține-ți mâinile în sus după dezinfecțare, mâinile trebuie să fie uscate pentru a putea îmbrăca mănușile sterile